





34.68 31297 TRAITE NOVVEAV

## METHODE BRIEVE & tres-facile.

Pour aisement paruenir à la vraye CVRA-TANTAR plusieurs belles OPERATIONS

Par 31297

RIDERIC de LEAVSON

TO de LEAVSON

A GENEVE.

Par Iean Iaques Raimondet.

M. Dc. LXXIV.



## Maria de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la c

## ILLUSTRE PUISSANT ET

# GENEREVX SEIGNEVR, FRANÇOIS de GINGIN, Baron de la Sarra, Seigneur de Ferriere & c.

#### ETAVX

Illustres & Genereux Seigneurs.
ALBERT de GINGIN Seigneur de
Lusser.

IOSEPH de GINGIN, Seigneur

d'Orny, &c.

HENRI de GINGIN Seigneur de Pompaples.

GEORGE de GINGIN, Seigneur de Chruilly.

D. François de GINGIN, Seigneur de Villars.

CHARLES de GINGIN Seigneut de Clepans.

### EPISTRE.

### TRES-ILLVSTRES SEIGNEVRS.



'HISTOIRE nous apprend qu'entre toutes les offrandes dont les Payés auoyét autresfois

accoûtumé d'honorer les Autels de leurs dittinitez, il ni en auoit point de plus considerable, ni qui fût plus agreable à leurs yeux que les premices, parce que c'étoit comme vn hommage particulier, & vne reconnoissance que les hommes leur rendoyet à cause que tous les biens de la terre dont ils auoyent la jouissance leur appartenovent proprement, & que c'estoit par leur bonté & faueur qu'ils en auoyent l'vsufruit. Voicy mes Tres-honorez Seigneurs vn liure que j'ofe prendre la liberté de vous presenter, c'est la pre-

production de mon esprit, &

## EPISTRE.

comme les premices, & les premiers fruicts de mes veilles & de mes estudes, c'est aussi la seule qualité qui me fait prendre la hardiesse d'en venir faire hommage à Vos Illustres Seigneuries pour tant de bien-faits & faueurs que j'ay receu de leur bonté, vous deuant tout comme ie fay il est juste que je vous rende ce que je puis & que sans regarder à la grandeur de vos merites & des obligations infinies que je vous ay, je tache quoy que foiblement de vous témoigner que je ne suis pas ingrat. Alexandre ce fameux Capitaine de l'antiquité ne dédaigna pas de reçeuoir des mains d'un pauure paysan les plumes d'vn Oyseau qu'il auoit nourri pour luy en faire yn present, & que la mort luy auoit mal-heureusement raui, Et vous mes Tres-honorez Seigneurs,

## EPISTRE

dont la vertu & la generosité ne cede rien aux plus grands hommes, & qui faites profession d'en donner des marques, & de la faire éclater enuers toutes sortes de personnes, Vous dis-je ne dédaignerez pas sans doute de receuoir ce foible ouurage ou vous ne trouuerez qu'vn effect de ma soûmission, & du respect que j'ay pour Vos Illustres Seigneuries. Il est dénué de tous ces ornements, desquels on a accoûtumé de faire valoir ces sortes de choses, on n'y verra briller ni ces fleurs de rethorique ni ces beaux mots recherchez, ni ce stil pompeux & coulant que les Escriuains du temps. recherchent auec tant de soin, que j'aurois difficilement pû atteindre dans vne langue qui ne m'est pas naturelle, & que je commence à

#### EPISTRE

peine de connoistre, outre que ta matiere que je traite estant simple en elle mesme ne demande que les propres termes de l'Art, aussi ne me suis-je pas mis en peine de toutes ces choses, & n'ayant eu pour but que de vous témoigner ce que je vous suis: Il m'a suffit que ma langue quoy que begayante ait peu expliquer foiblement vne partie des sentiments de mon cœur, estant asseuré d'ailleurs que Vous estes assez Genereux pour supporter mes foiblesses, & mes imperfections : C'est la faueur que je vous demande. Dieu qui vous à fait goûter les effects de sa grace en pleine mesure répande ses plus precieuses benedictions sur vos personnes & sur tous ceux qui composent vostre Illustre Maison

## EPISTRE.

come donne de rencontrer vn moyen fauorable pour vous témoigner qu'il n'y a perfonne au monde qui foit auec plus de refpect & d'inclination.

De vos Illustres Seigneuries.

Le tres-humble, tres-obeitsant, & tres-obligé serviteur.

F. De LEAVSON.

PREFACE

A pensée n'estoit pas d'arre-Menter le Lecteur par une Preface: mais le siecle ou nous viuons à engendré des esprits si chatouilleux, & tellement enfles de la bonne Opinion d'eux-mémes qu'ils ne sçauroyent approuuer la moindre chose, quand mesme ce seroit l'ouurage le plus parfait du monde; ils ont vn Empire absolu sur tout ce qu'on met au jour, & on ne leur peut contester les droit qu'ils ont de porter leur Iugement sur tout ce qui s'expose a leur veuë. Or comme je sçay que ce nouveau Traité ne man-

quera pas d'estre attaqué de ces sortes de gens. Ie ne l'ay pas voulu enuoyer par le monde, sans dire premierement au Lecteur la raison pourquoy je l'ay composé, l'ordre que j'ay tenu en le compo-Sant, l'otilité & le profit que le public reçeura par sa venuë, c'est dequoy l'ay crû qu'il vous falloit aduertir, afin que vous ne m'accusiés pas comme la Corneille d'Horace.

Ie vous advoise franchement que je sens ma foiblesse, & que je ne pretens point à la gloire des grands Autheurs, que je n'écris point pour les Doctes, mais pour ceux qui en scauent moins que

moy, mon dessein n'est que de sonlager ceux qui fuyent la peine ou qui n'ont point le loisir de feuilletter ces gros volumes, où cette matiere est diversement traitée & a diver (es reprises, & je ne pretens pas de détourner personne de la lecture de ceux qui en ont efcrit, de sorte que mon trauail doit estre au dessous de la censure & ne merite pas la critique des (çauans.

Ie traite des Hernies, de la fuppression de l'vrine, de la Pierre, de la Cataracte, de l'Vngula, de la sistule lachrymale, de l'Empieme, du Trepan, & del'Amputation d'vn Membre.

qui sont les plus hautes & les plus belles Operations qui se font sur le corps humain: & c'est à causde de leur importance que les Chirurgiens estoyent anciennement appelles la main de Dieu.

Ie montre de quelle maniere il les faut guerir auec des medicaments, lors qu'elles sont fraisches & recentes,& qu'elles ne sont pas accompagnées d'aucun facheux accident. Mais lors qu'elles sont trop rebelles, & qu'elles ne peuuent pas estre domptées par cette voyesje donne vne Methode tresbrieve, & tres-facile, pour les guerir par l'Operation de la main.

Pour ce qui est de l'otilité &

du profit que le public recesséa par la wenüe de ce nouneau né, i ayme mieux que chaeun en juge en particulier que de s'en rapporter à tous les adwantages que j'en poùrrois dire.

Quant à mes envieux je les prie de croire que lors que i ay mis la main à la plume pour composer ce nouveau Traité, ce n'a pas esté dans l'intention de m'ériger en Autheur n'y pour m'acquerir de la louange, mais pour inuiter quelque docte plume à faire mieux, cependant je diray auec Leonides.


## OVATRAIN.

Ce n'est pas tour en Chirurgie. De jargonner, mais le plus beau : Est, que les bandes on manie, Le seu, les sers, & le Ciseau.

Autre

Vn lit ce liure pour apprendre : L'aurre le lit comm'envieux , Il est bien aisé de le reprendre Mais mal-aisé de faire mieux.

RONSARD.



## Traité Nouueau.

OV

METHODE BRIEVE, & tres-facile pour ailément paruenir à la vraye Curation de plusieurs belles Operations en Chirurgie.

TRAITE' des HERNIES.

Du Nom & Etymologie des Hernies.

#### CHAPITRE. I.

V m fo

Voy que la recherche des mots & des noms, soit le plus in soutient ioutile, comme dit que la resident su second liure de la The-cherimots

rapeningue. Neantmoins parce que leur des mots intelligence facilite la connoissance des nons est chosts dont elle traite; l'ay creu de saire neessaire plaisir au lecteur de luy declarer à l'entrée

#### Traite Nouneau.

de ce Traité les noms generaux & com-

papellysts Nous lifons que les Grees appellogent arcienne anciennement toutes fortes de Tumeurs, ment tou en qu'elle partie qu'elles fuillent (fele) tes sortes Ce qui vant autant a dire que Herma on Genifer, theurs, lesqueis voyans cette amplitude lau la des signifers, theurs, lesqueis voyans cette amplitude lau la des significacions, les ont reduites a celles retaidells qui artiuent ordinairement, au Secotums des latins, qui artiuent ordinairement, au Secotums des latins.

Grees appellent en leur langue Bronchocele; parce qu'ils ont remarqué que ces parties que le estoyent fort sujettes a ces sortes de mala-Scrotum Teflicules dies, & parce qu'elles sont de differentes Aires fortes : l'etymologie du mot Hernia, se Nombril peut tirer de la dureré que les maux cauon Golier Cont fort lent, Car Hernium, vaut autant a dire que Sujettes dur & afpre; fuiuant la forme de parler des aux Her-Sabins, qui appeloyent Hermas les cailloux nies.

Histore Les François ont retenu le mot de Orientale Hérnia, parce que ceux qui en sont tour-parle mentés, sont fort hargueux. C'est a dire Sieur.S.P.

6 que ceux qui sont tourmentes des Hernies sont fort hargneux & chagrins.

de plusieurs Operations en Chirurgie. qu'ils tont fort chagrins & criards, principalement les petits enfans.

## De la definition & difference des Hernies.

#### CHAP, IL

T Ernie, ou Hernia est vue rupture de de la defin nition des la membrane interne du bas du Peri-Herniese tome, o vne relaxation de fon eminence qui detcend dans le Scrotum.

De la dif-On conte ordinairement huit fortes, ference des Her-

ou especes d'Hernies.

La premiere est appelée des Grecs, Bubonocele, & parles François Herme incomplette, parce que l'inteltin ou l'Omentum ne nocele.

detcend pas plusbas que l'aine.

La teconde est appellée des Grecs Enterocele, & par les François Hernie Complette, de l'Enteou Hernie imestinale, qui n'est autre choie rocele. que la descente desl'intestin dans la capacité du Serotum, Ce qui le fait lors que le la des-Peritoine le rompt a l'endroit ou paffent les cente des intestins. vaisscaux Spermatiques.

La troisieme est appelée par les Grees Serotum? Epiplocele & par les Latins; Ramex Zirbalis seu Omentalis, parce que l'Omentum descend de l'Epiplocele.

tout feul dans le Scrotum.

La quatrieme est appellée par les Grecs

Traite Nounean.

kydrocele, & par les Latins ramex aquosius. de l'Bly C'est a dire hernic aqueuse elle est ainsi apdrecele. pelée lors que la tumeur qui paroist au Scrotum, est faite ou procrée par vn hu-

meur lenre & aqueufe.

cele.

die farco-La Cinquieme est appelée des Grees farcocele , & par les Latins. Ramex carnofus. C'est a dire hernie charneuse, elle est ainsi nommée lors qu'il croir qu'elque matiere charncule aurour des testicules ou bien en leur propre substance.

La Sixieme est appelée des Grees physiocele & par les Latins. Ramex flatulentus. cele. C'est a dire hernie venteuse, elle est ainsi nommée lors qu'il y a des venrofirez en-

fermées dans la capacité du Scrotum. La Septieme est appelée des Grees Cirsodu Cirlocele , & par les Latins. Ramex varicofus, C'est a dire hernie variqueuse, elle est ainfi nommée lors que les veines du Scrotum &c des tefficules font excessimement remplies

de fang, & qu'elles se dilarent en formede varices. La Huitieme est appelée humorale, parce del'humorale. qu'elle est faire & procreée par la fluxion,

d'vir ou de plusieurs humeurs entembles. Ily a encor l'Hernie que les Grees, en leur langue appelent exemphalon, & les Latins,

umbilici immorem (ess prommentiam, & par

de plusieurs Operations en Chirurgie. les François Hernie umbilicale. nies o

Apres celles cy suivent les Hernies composées, comme celle que les Grecs appellent Enterapiplocele cette Hernie est ainsi appelée , lors que l'intestin & l'omentum font tous deux descendus dans la capacité

da Scrotum Hydroenterocele, est aussi vne hernie de l'hy-composée, parce que l'intestin qui est de l'hy-trombé dans le Serotum, est accompagné, vocels. de celle que les Latins appellent aquosus.

Hydrophysocele, est encor vne hemie de l'hy-composée, elle est ainsi nommée, lors que drophysol'Hernie venteuse est accompagnée de la cele.

laqueisse.

Hydrocarfocele, oft encor vne hernie composée, elle est ainsi nommée, lors que de Phyl'Hernie aqueule est accompagnée de quelque mariere charneule, qui croist autour des Testicules, oubien en leur propre substance, comme i'ay dit cy desfus.

De la cause des Hernies en general, & du prognostique d'icelles.

#### CHAPITRE III.

N peut reduire la generale cause des se des hernies a ces deux points, scauoir, bernies.

#### Traité Nouveau.

a la cause Coniornte, & à la cause antecedante. La caufe consonte, est lors que l'intestin le cointe ou la coeffe tombe dans le scrotum.

La cause antecedante est la dilaration ou

dela can- rupture du perstoine.

Or le persione se peut rompre & dilater dante. par pluficurs caufes, entre lefquelles il y à que le pe- des internes & des externes , les internes vitoine se font des humeurs qui sur-abondent dans

nostre corps.

Les externes penuent estre comme pour auoir reçeu que que coup de pied ou antre, ou pour auoir trop crie, ou pour auoir lin.I. cha. trop fauté, ou pour auoir retenu extraordinairement fon fouffle, ou pour auoit porté quelque pesant fardeau, ou pour s'estre trop efforcé apres les femmes, principalement lors qu'on a le ventre rempli

de ventofitéz.

hernies.

Pour ce qui regarde le prognostique des du progno- hernies, on peut dire que les hernies en general font fort difficiles à guerir, parce qu'il est tres difficile de reunir le perstoine qui est vne membrane minfe & nerueule, ioint que iamais , ou bien auec grand peine il se reunit par des medicaments, sinon lors que la rupture est bien perite ou fraiche, & lors quelle arriue aux petits enfaus. Mais hors de cela il faut employer la main de l'Operateur.

## Des signes des hernies.

## CHAPITRE IV.

le general figne des hernies.

E signe commun & general, des her2...

nies, est vne tumeur contre nature qui Les signe
paroist aux testicules.

du bubo-

Cependant il faut fei remarquer, qu'il es quelune quelque fois que l'intettin defend questitout feul en l'aine, & quelque fois il est l'omentiaccompagné de la cessife ou omentue ii & il se fourpeut autili artiure que l'omentum tombe en Les fourl'aire fans l'intestin, si c'est l'intestin le missel'aire fans l'intestin, si c'est l'intestin le missemalde à beaucoup de douleur. & loss less que
qu'on tache d'en faire la reduction, on l'intestin
remarque qu'il l'entre dans le ventre, auce en l'aire,
bruit & gargoiillement.

Et si c'est l'omentum qui y est descendu, signes la tumeur est beaucoup plus molle que pour conles autres, & le malade ne sene pas tant de 1 ométum de douleur, & quand on la repoussé dans le séléciéals ventre, elle ne fait aucun bruit.

"Paine de l'ame cele.

testinale font quatre. Tentero-Le premier est que l'on remarque, que

tantost la tumeur croist, & rantost elle se Selfe lim. diminue, ce qui arriue lors qu'il est tombé 34. chm.7. vne trop grande portion de l'intestin dans le Scrotum, ou bien que l'intestin est plus plein qu'a l'ordinaire, foit de ventofitez ou de fiente.

Si l'intestin qui est tombé dans le Scrotum, est trop rempli de matiere secale, il ne peut point estre repoussé en son lieu naturel, & le malade fent beaucoup de douleur , au Scrotum , en l'aine & par tout le ventre inferieur, a cause de la solution de" continuité, qui se fait en ceste partie, ioint que le malade vomit des humeurs, rougeaftres, verdes, & noires, & rend quelques fois de la fiente par la bouche, & le testicule deuient tout enflammé, ce qui arriue a cause que l'estomach souffre par vne certaine vertu sympathique.

Le Second est que la tumeur n'est pas doulourenfe.

Le troisieme est que quand le patient est couché, l'intestin retourne facilement en son lieu naturel, le plus souuent sans le presser, mais il r'entre pourtant bien plustoft & plus facilement lors qu'on le preile auec la main, il entre aussi quelque fois de

de pluseurs Operations en Chirocogie. 9 foy melme dans le ventre quoy que le malade soit debout, & en entat en son lieu naturel il fait du bruit, comme le bubonocete, & sicc'est l'omenum, il ne sait aucun bruit.

Le quatriéme est que l'on voit vue tumeur, ronde, égale & luisante;

Lépiplocete, le connoît facilement au se toucher, car la turneureft beaucoup plus le ficus molle, que celle de l'intettinale, & en le peur est rouchant il femble qu'on touche de la piplocete, laine, a caulede la graiffe de l'oneneurs, de l'intettinal, de retourne fort difficilement dans son lieu naturel, de lains faire aucom brût.

L'hydrocele. Se connoiltencor fort fa- les signes cilement, car premierement on voit vue pair contumeur ensiée, ronde, égale & luisante, & noistre lors que le malade a enduré la feim elle se l'ydrice lors que le malade a enduré la feim elle se l'ydrice.

diminue.

Secondement les veines du Sereum s'enflent & le tumchent, & fi on preffe deflus latumeur, l'humeur qui eft contenu en icelle regorge dans les vailfeaux qui anparauant ethoyent flettris, & pour la oien connoittre, onn'a qui a mettre vue chandelle allumée en la partie oppofite de la tumeur, on la verta au trauers; four de melime comme fi on regardoit au trauers d'ut verre, ou d'une come delice; l'olint que cette forre d'hemies n'eth pas accompagné de

Traité Nouneau douleur, & ne se forme pas tout d'vn coup, mais le Scrotum s'enfle petit à perir.

TO Le signe earfocele.

On connoist le Carsocele , parce que l'on sent vne dureré Scirrheuse', assauoir aspre, inesgale & rabouteuse, & vne inflation qui demeure tousiours en la partie, fa couleur est comme celle des genitoires, & elle croit auec douleur.

Gone du

Le figne du Physocele, est que l'on voit Phylocele. vnc tumeur ronde , legere & beaucoup plus luisante que l'aqueuse, on voit la bourse & la verge enssée, les veines du Seroum font fort bourfoufflees.

Le signe du cirsocele, est que l'on voit que les veines du Scrotum font fort tumefiées, emmoncelées, & entortillées l'vne dans l'autre, comme les tendrons de vigne & le testicule descend plus bas qu'a Pordinaire.

l'humovale.

Le figne de l'humorale, est touz de mesme, comme ceux des autres tumeurs contre nature.

#### De la division des bernies.

CHAP. V.

Las hernies sont divisées en deux parties assancir les trois premiers. Bubonoce-

de plusieurs Operations en Chirurgie. It le Enteroccie, & Espisaceles, font propreinent appelées hernies , parce qu'elles inneates ment appelées hernies , parce qu'elles enteroccie font faites ou cautées , par la cheure ou 6, répite descente de l'intertition oud c'iomentum dans cets, sont la capacité du Serotum, & parce que ces surgents en la capacité du Serotum, & parce que ces trois hernies ne font pas fixes ni attachées en vn metim elius, "cat tantoft elles paroillent & tantoche les font appelées hernies, parce que ce font les plus arguernes, & qu'elles n'elpargnent aucun aage ni condition.

aage ni condition.

Les cinq dernieres alçanoir, l'Hydro-physicale cele. Carpeale, l'hybete di Hiu-etipeele, morale, ne lont appellées hernies que par de humanimilitude, parce qu'elles procedent d'une parties contenues dans le Soroum, 8 Eparte parties contenues dans le Soroum, 8 Eparte hernies ce qu'elles font nombrées, entre les tu-que par meurs contre nature, a cauté qu'elles finilitudent faites par la fluxion out congestion des de.

humeurs.

ане сенх

diusries

Description Anatomique de quelques parties qu'il fant necessairement scauoir pour paruenir ala Curation des hernies.

#### CHAP. VI.

ani Treu-Our faire ces hautes operations , il est lent faire tres-necessaire d'auoir vne parfaire ces operations dois connoissance de l'Anatomie, Et comme uet ausir c'est aux testicules que ces operations se vne par- font , ic tacheray d'en donner ici la defneiffance cription, felon que iel'ay peu remarquer, de l'A- & pour le soulagement de l'Operateur.

le dis donc que les Testicules sont des corps glanduleux, fort rares, mols, blancs, & spongieux, composés de veines, arteres,

sefficules, nerfs , chair , & rumiques.

Les veines & les arteres , viennent des vaiiscaux spermatiques, leurs nerfs sont fort menus, & naissent de la quarrieme & cinquieme, coniugaison des l'Ombes, & de la 5. & 6. de l'os Sacrum, leur chair est

spongicuse & glanduleuse.

opinions Touchant les tuniques des testicules, les toucham Anatomittes n'en sont pas d'accord, car les vns en content 3. les autres.4. & les autres gues, des 5. quant a moy ie laifferay ces autheurs dans

tofficules. leurs opinions, & diray seulement que les de plusieurs Operations en Chirurgie. 13 testicules sont entourés & enucloppés de

pluseurs tuniques.

De ces tuniques les vnes se peuuent que des nunnommer communes , & les autres propress inficultes
l'appelle communes celles qui enueloppent son comles deux testicules ensemble, & les promunes de proses qui n'en enueloppent qu'un seul, propres-

celles qui enneloppent les deux testieules, se pennent reduire a deux.

La premiere est appelée par les Latins su sensis Seratum, a qui est vue pean fort laxe, 674 stifminse, 82 sidée, elle prend son origine son de dre, pour encolopper les deux sessiones de comme le vien de dre, pour encolopper les deux sessiones de la vincilia de cette peau il y aviven ligne qui viene du fondement, 62 s'auance par le periné susques au gland de la verge.

Du milieu de cette membrane s'unance spranie vue peau membraneuse appelée par les des ent. Giese d'avres, qui separe les deux resticules, des la la commandant que qu'il se soinement , cependant que y qu'il semble que cette truique soit commune aux deux résidents suiest seque l'on remarque , qu'elle ne les courre pas tout a fair, car elle est artichée à la peau , & a l'autre tunique qui se voit desfous elle, car felle les courreis es entisedior de cours coltès, elle pressionet trop les validant spermad-

14 Traité Nonneau

ques, & par ce moyen les empelcheroit de Galië au neule , & par confequent tenduë & liure de

la Semen durc;

ce : Culf Des Propues la premiere est appelée par Bappellé Galle estroy de , elle prend fon origine de vagiante la production du perstom. & tert pour inguesta, ucltit les valificanx (permariques a l'endroit Elephory. do ils fortent de l'abdomen; & pour les deparer accompagneren bas, ou elle les enferme qu'alte s'à Comme dans vu eltry auce les efficienter.

mince, les La seconde est appelée par les Grecs ausres lappellent epididyme , Celfe l'appele tunique moyenes elle prend ion origine de la membrane des Erithroyde parce vaisseaux spermatiques preparens lesquels qu'elle est elle reçoit par vn bout, & a l'autre elle parsemée, donne iffue aux éjaculatorres , elle est attade platchée a la reste & fonds du testicule mais elle fieurs vai Teaux est separée par les places entre les deux

qui font extremitez.

res er preparens.

émige. Cette membrane fert pour joindre les édu-vient Cette membrane fert pour joindre les aufquion véilléaux preparent, & étaeudateures aucc papelle le les étiticules, & pour parcuire de blanchir mer range la femence, & lois qu'elle l'acinit preparée Eribérée & blanchir , elle l'ennoye aux seffiseules, Paul Age.

vaisseaux.

8 description de l'Epididyme.
9 l'Epididyme serv pour joindre les vaisseaux éjaculatoi-

de plusieurs Operations en Chirurgie. 15 par des certains petits canaux pour y reçeuoir sa forme . & puis elle la retire par les melmes conduits pour la verler dans les vales éjaculatoires.

A ces susdices tuniques les anatomistes de la tuen adjoutent encor vne autre, qu'ils nom- nique alment albugeneuse , qui est membrancuse & bugensuse nerveule, fous lesquelles se descouure, la substance molle, glanduleuse & spongieuse des testicules, dans laquelle la semence recoit la perfection, la forme, & la fecodité.

De la Curation de l'Hernie que les Grecs appellent Bubonocele, & les François Hernie intestinale, lors que le peritoine n'est que dilaté.

#### CHAP. VII.

D'bonocele, ou hernie incomplette, Ba'est autre chose que la descente de l'inteftin ou de l'omentum aux aines , l'inreftin descend dans le Serotum, ou parce troissignes que la production du Peritoine se rompt, pour conou qu'elle se dilate.

la produ On connoir si la production du perisoi-Hion die ne est dilatee par les tignes suiuants. perissine ost dilaté

Premieremet l'intettinne tobe pas subi-

16 Traité Nouneau tement mais il demeure a l'entrée de la production; Secondement l'inteftin ne descend

jamais jusques au fonds du Scrotum.

Et finalement ont voit vne tumeur qui est molle, égale & profonde;

deux in Lors que la production du peritoine est dications dilatée Auicenne nous propose deux indifelon de cacions, la première est de reduire l'intelsierme tin dans la capacité de l'abdomen.

unit a la unit a

bir fabri. tes ce qui read la tumour fort rumefée , fi cius lin: cela eft il faudra faire vu bain d'eau chaude, 1.640;1. y adjoutant vú peu d'huile, ou bien faire le bain d'huile toute pure, & fe feruir des to-

Dan a nutte tottee pure, of e teruit acs topiques lentitis, & faire quelque fomentation chaude auce des feruiettes fur la tument, puis appliquet dellus la partie le fuivant cataplaime duquel on fait grand chat.

22. Radio, alibea collar, ex agua

& contufar, ib. B.
faren femin line, tutyr. and Ziij.
oleic communic Ziiij. mulf. q.s.
fat cataplasma.
La (conde indication qu'Auicenne nous

de plusieurs Operations en l'hirurgie. 17, propose est qu'ayant remis l'intestin dans la seconda fon lieu naturel il faut empecher qu'il ne indicat, son leu nombre est d'ampre est d'ampr

Pour paruenir a cette intention il faut eber que tacher de reunir ce qui est dilaté, &c en l'instilio ofter les caules tant internes qu'externes, be bers de la principale caule interne est l'humidité ent lieu, qui relaiche, &c ramolit la production

du peritonia.

Au peritonia.

Pour remediera ecci,il·le faut seruir des faut faire medicaments qui desechent, fortifient, se puir parqui resterent, Cest pourquoy il faut pre-ester in-mierement songet a la generale curation semior; du comp. Cest a dire qui faut ordinare 7.

vin adstringent.

Celaefant ainsi obserué, il faut purger medes les humeurs qui sont rombées dellus la pour partie, auce des remedes phémagogues, go les haccommes l'agatie, la manne, du miel rosa, meurs qui exce ou loit auce medicaments qui purgent bies des les ferostréz comme le siron de calament—la partie, the ou de hysoppe, ou de beroine e, cuite auce du fenouit & du perticeli, &ce.

Apres cela on le fert des adftringents, glutinatifs & deflicatifs, Comme par exemple: Henna für Peliganum minus, Betonica, Symphytum, Tesfa rubra & pluficius autres dequoy on poutra compofer des porions, poudres, electuaires, rant folides que mols, & autres femblables remedes, les emphalties que l'on veut appliquer deffus la partie, doinent eftre defficcatifs, & adfliprieunes comme par exeme

9 fficcarifs, & adftringents comme par exemauteenne ple celuy qu'Auteenne nous a laisse par

liu. 13. elerit.

By. Cortic grandt 3.x. gallar immatur 3.v. vini adstringent 3.v.

Faires cuire le tont ensemble, & lauez la partic auec de l'eau froide, puis mettez y le sus dit emplastre par dessus, & ne le renounellez que dé 4-en 4-jours.

C'est emplastre cstant appliqué dessus la compresses erbanda partie malade il y faudra mettre par deffus ges tresvne compresse faite en triangle ou bien necestaiquarrée selon la necessité & puis bander la respour partie auec vnebonne bande, detoile, de empecher la largeur de 3.0u 4 doigts & de la longeur que lin teffin no de3.ou 4.aulnes, afin d'empecher que l'inretombe. testin ne retombe dans le Serotum;

#### De l'operation manuelle du Bubonocele.

#### CHAP. VIII.

S I apres tous ces remedes, l'Hernie n'est de l'opepas guerie, il faudra venir à l'opera- ration tion manuelle qui se fait ainsi.

Il faut premierement fituer le malade destis vn banc, ou bien vne table, & sil de la fielt necessarie il luy faudta lier les cuisses du malade luy faire tenit les mains par des serui-de teurs.

Mais il faut icy remarquer que le bane remarque fue le bane remarque fute vogait faus ou la table fur lequel vous aurez fitte vofitre malade, doit effire a moitie deoite chant le 
c'eft a dire que le bour ou eft la tefte, cat bane ou 
autrement la tument se pend, de forte que la table 
l'on ne sait ou il faut faite l'incision a 
sur tapet l'incision qu'on fasse cousine de 
moins qu'on fasse coussire de 
sur tapet 
te malade.

Le malade c'estar ains fitte s'est la tert. 

Le malade c'estar ains fitte s'est la tert. 

al 
sur l'apresent 
proprie de l'incision s'est l'incision

Le malade elfant ann hitue, & la tumeur elfant apparente, il faudtapour ne fei l' faut pas tromper, marquer le lieu, ou vous marquer pretendez de faire vostre incision auec de l'eu vent l'encre.

Puis prendte le cuir auec les doigts de cifié aues la main gauche ou bien comme font plu-de l'eners fieurs bons operateurs auec des tenailles

to Traité Nouneau

il fait Herniaires afin d'empecher que le pacient prondre le cuir ause les deiges, quez que ces tenailles doinent eftre gamies de suis ause de quelque choic de mol, car autrement des tracille cauleroyent de l'inflammation; mailles

mailles
Herniai
il faudra faire l'incision dessus la marque

que vous aurez faite, c'est a dire en Paine liue on il a l'endroit de la tumeur, ou au milieu de fausforre la tumeur melme, l'incision se doit faire en l'incision trauers, & longue de la largeur de trois

la gran, doigts, incifant la peau est la membrane deux és charneuse, insques au Periteine en se busgearde donnant bien garde de ne lepas ossence. Pineisian. Celse veut qu'on salle haudiment l'inci-

Celle veur qu'on falle haidiment l'inciité faut fion iusques a la tunique moyenne, qui cht donner cette tunique qui forme & represente garde ne comme vn fourreau, appelé Eltroyde; pui inci-

pas incifer le Perisiane, auce vne espronuette, ou bien auce risiane. les doigts, & le pousser bas, & en le Celle lin. poussant if aut remettre l'Omentum ou

7, the p.a. l'inteflin dans le ventre, en le separant du muscle oblique descendant il le faut riter il faut un autorité par la fair plus aisement, on il fautre n'a qu'a passer vn filet au trauers d'icclui, finessim en prenant la tunique auce vn linge delié, autorité me prenant la tunique auce vn linge delié, autorité me d'imé de le tire jusqu'a ce que l'on soit venu au tunn dans vuide, en le descharnant tout autour.

de plusieurs Operations en Chirurgie. At it Ces choles chant faites, il ne faur que quel me-coudre les bords de la playe ensemble, & faut senir la traiter comme vne timple solution de en la cu-continuité.

Il faur icy remarquet qu'il arriue quel·ess fortes que fois, que l'on coupe la tunique qui fai paysi, couure l'Omentum ou l'intellin ce qui eft es qu'il caufe que l'on ne le peut quelquestois pas faut founter, si cela arriue il faut prendre les fils tuniparties qui font ditifées auec le Peritonne, que qui s'il el posible se les coudre enfemble se le Coment fe fertuie du bandage.

autre Operation du Bubonoccle qui se fait aucc le fer chaud.

#### CHAP. IX.

Ous remarquez bien, que la fudite conflét le operation ne, confifte feulemens operation, qu'en la conture de la pean, laquelle chant reflextée, ne peut du moins , que de faire vas cicartice, laquelle empeche la relaxation du Peritimes & la décente de l'in-

C'est pourquoy je m'en vay d'escrire la du Buba methode de faire cette operation parle fer le se chaud, c'est a dire par le caurere; que les malades ont cette operation en bor-

yeur.

en query consiste cette ope-

rasion.

ce qu'il faut que

le malade fasse anat que de faire l'operation.

ce qu'il

faut faire Lors que

La tumeur Le montre. dela si-

tuation du mala

qu'est ce Enuterifer

Ie sçay bien que les malades ont bien de la peine a tereloudre, de fouffrir cette operation, parce quelle cause de tres grandes douleurs, & parce qu'elle est fort mal ailée a faire:

Cependant elle est fort approuuée par les modernes, & non fans railon, car le fer chaud refferre la peau par la force du feu, & en meline temps fait vie cicatrice, dure & retirée, & parce moyen abaisse la

tumeur , & empeche que le Perstoine ne retombe plus bas : la maniere de le faire est rel.

Premierement il faut mediocrement faire agiter le malade, puis par vue toux violente & vne extension du corps, c'est a dire qu'il faut que le malade retienne son souffle, afin de faire éleuer la tumeur, & afin qu'elle se montre selon la grandeur

qu'elle eft. La tumeur estant apparente, il la faut remarquer triangulairement auec de l'en-cre, qui ait sa bate d'enhaut en trauers.

Cela estant file il faut coucher le malade ala renuerle dellis vn banc ou table, comme j'ay dit cy dellus , & appliquer dellus

la tumeur le Cautere clauere embralé, fur la marque du miliell du triangle.

Puis il faut canteriler les lignes ou qu'il fam coltez du triangle auec vn ferrement qui

reffemble

de plusieurs Operations en Chirurgie 23 reflemble cette lettre grecque. T. phis auce vn ferrement l'enticulaire , ou le cautere a platine, il faut applanir tout le triangle, c'est a dire qu'il faut cauterifer il faut bis tout le dedans du triangle & faire en forte prendre qu'il n'y ait que la peau & la graisse qui garde que fentent la chaleur du feu, & non le Pe- le Persieiritoine, la cauterilation estant faite, il ne ne sen-faut appliquer dessus l'escarre du sel pile chaud. auec vn pourreau.

De la curation de l'Hernie que les Grecs appellent Enterocele, & les François Hernie intestinale, lors que le Peritoine est rompu.

#### CHAP. X.

Yant parlé de la curation de l'Hernie incomplette qui se fait par la dilatation ou relaxation du Peritoine que les . Grecs appellent Bubonocele ; il faut que ie parle maintenant de la curation de l'Hernie complette, qui se fait lors que le Peritoine est rompu, appellée des Grecs Enterocele. desinition Enterocele donc n'est autre chose, que la de l'enteTraité Nouveau qui arriue lors que le Peritoine se rompe ou élargit a l'endroit ou passent les vais-

¿ feaux spermatiques.

descuips Ot le Perstoine Errottpt, ou pour auoir pourque trop crié, ou fauoie, ou d'auoir porté vn le Fériai-petant fardeau & autres chofes femblables, au fieu ou paffent les vailleaux (permariques « comme je viende dire qui iont aux aines lefquels a caufe qu'ils fout membraneux, se dilatent & soutrent, a quoy aide auffi beaucoup la pelaneur des incettins, &

de l'Omentum; les fignes Et pour sçauoir si la cause de la tumeur DOUT GA est fixe dans le Scrotum ou fi c'est l'intestin uoir si la ou l'Omentum qui y est descendu il ne faut tumeur que chercher auec les doigts au dessus du eft fixe dunele testicule le Processus, que plusieurs modernes pour s'expliquer pluitoit facilement que proprement appellent didyne, & s'il le trouue plus plem que des vases ordinai-Scratum on fi c'est l'intestin . oul Omeres, & qu'on y lente quelque corps lolide, \$14777.

c'est signe que l'intestin ou l'Omenium est descendu dans le Scroium.

lay palé des fignes de l'Enterecele au gues pour chapitre 2. C'et pourquoy ie patiera y feulefeueir fi ment, des fignes pour connoître lors que. le Periscine el rompu, le figuels font deux. Le premier eft que l'inteffin & l'Omentum tombent tout d'yn coup jusques au.

tonds

de plusieurs Operations en Chirurgie. 25 fonds du Serotum,& le malade sent de tres grandes douleurs.

Le second est que l'on voit vne tumeur

qui est inégale.

Les indications curatiues de l'Emeroeele, font tout de melme que celles du
Bulonneele, Car il faut remettre l'intellin
dans fon lieu naturel & empecher qu'il ne
retombe, ce qui fe fera par des medicaments fortadîtringents, & deficcarifs, qui
par leur vertu deschante & adîtringente,
reuniflent & agglutinent la rupture du
Peritoine, pour, cet effect on le pourta
fort heureulement seruir du suitant emplattre.

R. Terebenth. 3. j. B.

ichthyocoll carnis cochlear, ana, 3

Pour bien faire cet emplaftre il faut premierement tremper de la colle trois jours dans du vinaigre , & puis apres la lauer, & la broyerdans vn mortier de plomb, & enfin la rfondre au feu, & la meller auec le reste.

Le suivant cataplasme n'est aussi pas a rejetter.

34. Herba herniosascum radicicibus, M. i. eataplasradicum symphits & osinunda regalis ana Z.i.

a farına fabarum & bordei. ana. 3 j. B.

Faites cuire le tout en deux parties, sçauoir vne partie auec eau de forge, & vne partie de vin sustere , pais y adioustez Terebenihine, Ziij. Fia Cataplasma. 1

Il ne fera pas mannais de fe feruir aussi

il no faut quelquesfois, de quelque fomentation pule for afin que la nature ne s'accoustime a vin mir ton. Cul remede, lequel par apres elle pourroit fiours d'u negliger, & pour ce faire le fuiuant ne fera pas maunais. Prenez de l'eau de forge, & mede afin faites-la bouillir adjouftez y de l'alun selon quelans-lances pla quantité de vostre cau, on bien prenez accoufu- de l'eau ou on aura estéint de la chaux viue, faites difloudre en cetté can vn peu de vitriol blanc & vous en seruez pour fo-

.. menter la partie. ...

Acce, dit que le papier trempé dans de Acce, au l'eau adfringente l'espacé de trois jours est le sermen fort bon , duquel papier il faut faire vn chap.14 pelloton , c'est a dire vne compresse, & ayant remis l'intestin, il faut appliquer cette compresse desfius l'aine, accompagnée d'vne bonne bande, & ne la point dettaire qu'au bout de trois ionrs, & vous verrez TO

Amb.Pa- la grande vertu de ce papier, - - 1 ... 1

Amb. Paré, recite qu'vn chirurgien de vé liss. 8. des IHles amis a guerit plusieurs enfans, auet la meurs en poudre de la pierre d'aimant lequel il lier ch.15. mefloit parmi leur bouillie, & frottoit les

de pluseurs Operations en Chirungie. 27 aines là ou effoit la defeente, aucce du miel, puis y mettoit par deffus vu peu de l'imaille de fet, & continuoir ce terméd l'espace de dix ou douze jours, & embandoir la partie auce vu bon bandage.

partie auec vn bon bandage.

P. Pigray. Commande de donner au p. Pigray
malade; l'espace de quinze riouts vne au Bi. A.
dragme de limaille defre, auec du gros vin de sturouge, & appliquer deffus la partie vn emplattre, ou'il entre de la pietre d'aimant.
La tailon de ces remedes est, que com-

La raison de ces remedes est, que comme la pietre d'aimant par une ertaine vertur secrette, atrire a soy le fer, ainsi estant prinse par la bouche, où appliquée par dehots. J'aimant voulant atrirer le fer a soy, tire en mesme temps auce violence, les corps charneux de apideux qui sont entre deux. J sesque d'article, bouchent le passage du Perisine. & auce le temps s'incorporans auec sicelle, empechent que l'intestin ou l'Omentum ne tombe hots de son lien parque.

# De l'operation manuelle de L'Enterocele:

#### CHAPITRE XI.

Diverles Fortes en N opere en cette forte d'Hernie fort diuersement, car les bons Chirurgiens manieres d'operer. ou Operateurs, operent sans arracher le testicule, & les Empiriques arrachent le tefticule.

Or on opere sans arracher le testicule sans arra-cher le te-siculs en offencer les vaisseaux spermatiques, & la deux fa- seconde se fait auec lesion d'icelle, & perte cons. de la faculté d'engendrer de la femence.

Si c'est sans lesion des vaisseaux spermariques, on opere en pluficurs manieres, lesquelles buttent ou tendent a ceci, affauoir de refferrer & congluttiner ce qui est dilaté ou rompu, afin que l'intestin ne delcende plus, le m'en vay commence par celle qui se fait sans arraclier le resticule.

Pour bien faire cette operation il faudra Ce qu'il faire retenir au malade pour vn peu de téps, fuui que fon fouffle, afin que l'on puisse mieux remarquer la grandeur de la rupture , laquelle ayant apperceije il la faut marquer auec de l'encre, selon l'étendue de la partie malade.

Cola

le mala. de falle pour bien faire corte operation.

en l'Enterocele. On opere Sans arra-

Plusicars manieres d'operce Sans offenter les Unissonux Bermatianes.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 29

Cela estant fait il faut coucher le malade de la sia la renuerse dessus vn banc ou vne table, qu'il faut en telle situation qu'il ait sa teste penchan-donner au te en bas, pour ce faire il faudra mettre malade. dessous ses fesses vn oreillier afin de le rehauffer.

Le malade estant ainsi couché il le fau- il faut dra lier en plusieurs parties de son corps, ascanoir les bras, les cuisses les genoux, foit lié en les pieds, & la poitrine, mais remarquez plusieurs que la bande que vous passerez dessus la paries de poitrine doit estre vn peuplus large que les fon corps. autres, afin de ne point blesser le malade.

Ces choses estant faires, il faut remettre de la rel'intestin ou l'Omentum dans le ventre, & dutio de faire tenir la main d'yn seruiteur dessus le l'intestin petit ventre, afin qu'en faisant l'operation ou de l'Oils ne retombent hors de leur lieu naturel. mentum.

Cela fait il faut que celuy qui doit faire deuoir de cette operation, tire a soy auec la main l'Operagauche la peau qu'il aura marqué auec de teur. l'encre , & aucc la main droite il faudra couper toute cette peau diametralement en rond, auec les membranes, jusques a la tunique vaginale, rompüe ou dilatée. il faut

Ou au lieu de rirer cette peau vers vous, faire vne vous n'auez qu'a faire vne incision en la plus haute partie du Scrotum, & passer vn haute doigt ou yn crochet par dessous la produ- partie du ction , afin de la bien comprendre , puis il Seresum.

incilion en la plus

Traité Nouneau

la faut tirer en haut vers l'incision que vous aurez faite, & ladescharner auec les doigts du Scrotum & des autres parties ou elle adhere auec les fibres.

il faut prendre earde a la dilatatio

Puis il faut prendre garde a la dilatation du processus, & luy laisser vne espace proportionnée, qui ne soit ni trop large ni trop estroite pour contenir les vales.

du peritoine. division de la production du peri. toine en amatres parties.

Ayant ainsi attité la production, il la faut dinifer en vostre esprit en quatre parties , & la prendre auec des tenailles Herniaires, puis il faut auoir vne aiguille vn peu plus longue que le doigt, & vn peu courbe vers sa pointe, laquelle aiguille doit estre enfilée auec du filet commun, en trois ou quatre doubles, & de la longueur que vous leiugerez a propos, ce filet doit eftre graiffe auec vn peud'huile rofat , ou du beurre frais qui ne soit point salé.

re de coucoffies.

Vostre aiguille estant ainsi preste il la faudra passer au commencement de la sedre le pro conde partie, & la repasser par la fin de la troisieme partie, & puis la repasser au commencement de la quatrieme partie, en telle forte que le filet puisse comprendre les deux parties de la largeur du processus, affauoir les deux parties qui font au milieu, cela estant fait il faut lier les deux bouts du filet eniemble, puis couper affez prés du

de plusteurs Operations en Chirurgie. 31 sprofile la plus grandepartie du processius, alla sprofile unic cette partie qui se voit entre les deux sprosints, d'aiguille que vous auez faits, & couper couper ledit processius depuis l'ouuetture jusques au filet 9 ahn qui il ne demeure enclos, & par ce moyen l'escarre ou la cicarrice se fait mieux.

Toutes ces choses estants saites, il faut faire vne ouuetture dessous le filet, asin que la sante & les autres humeurs se puistent évacuer.

Ou bien pour empecher que les huneurs la manie. ne descendent de flus la partie malade ou ils re de faicauseroyent de la douleur voire de l'inflam- re l'incisit mation s'ils n'auoyent issue, on poutra peny don-faire la coûture au dessis du processes, se ge aux couper en deux tout ce qui est compris humens. entre les deux coûtures & faire vne ouuerture au processus prés du testicule, & appliquer dessiis la playe vu blanc d'œus, qu'il saut
estendu sur des estoupes, messé auec vu appliquer peu de bol d'armenie qui sera glutinatif, dessus & ainfi continuant la curation, on fe l'incision pourra seruir ides sarcotiques, ve terebenthina &c. fans oublier d'y mettre par dessus l'emplastre surnommé barbarum, la cicatrice estant faite le malade se pourra leuer & porter durant quelques iours vn Cerat adstringent, accompagne d'vn bandage.

Il y a des Opérareurs, qui au lieu de

autre
maniere
de faire
cette opevation,
par le fer
chaud.

Traité Nouneau

faite la coditute comme ie vien de dite, le feruent dufer chaud, & cauterifent toute la tunique dilatée, non feulement aux extremitez de la dilatation, mais auffi en droite ligne, & felon la longueur de la ditte tunique & auffi fur le milieuspatee moyen la tunique le retire & fe rend Calleufe, parce que la cieartice s'y forme, & ainfi la tunique fe reffere, & fi cela fe fait aucè prudence on fauue prefque toutes les parties qui font dettines à l'élaboration de la tunique fe teffere.

Mais parce que le fer chaud donne beaucoup d'apprehention au malade, ce qui lui nuit beaucoup, il y en a qui fe fetrene de l'huile rofat tout chaud, le quel huile ils appliquent deflus la partie auec vn affergeer ne de donnant bien garde de ne pas toucher les parties circonvoisines.

mariere seminale.

#### Autre Operation de l'Enterocele appelée le Point doré.

CHAP. XII.

qu'est-ce que le point doré

dulieu ou il faut faire l'incision.

Ette operation est appelée le Point doréparce qu'elle se fait auec vn fil d'or, la manière de le faire est telle. Ayant situé le malade comme s'ay dit au

chapitre

de plusieurs Operations en Chirurgie. 33 chapitre precedent, il faut faire vne incision en la pius haute partie da Scrotum , c'est a dire qu'il faut faire l'incision , au penil, puis il raut tirer en haut la production du peritoine. vers l'incision & la descharner ou separer du Serotum, & des autres parties où elle adhere, & puis separer les vaisfeaux ipermatiques auec le mulcle sufpenfoire du tefticule.

Ayant ainfi attiré le processes il le faut diuiter en voltre ciprit en quatre parties comme i'ay dit cy dessus. Et de ses quatres parties il en faut laisser vne pour donner paffage aux vaiffeaux, puis auec vne aiguille de la longueur d'vn bon doigt enfilee d'yn filet d'or de l'espailleur d'yne grosle cípingle & de la longueur de deux ou trois doiges, ayant l'vn des bouts pointu comme la manievn cipingle, auec lequel bout il faut faire dre la vn point a la fin de la premiere partie, la produttis quelle vous auez laissée pour donner passa-du perige aux vaisseaux, puis il faut repasser vostre teine. aiguille au commencement de la seconde partie, & puis la repasser derechef a la sin

en prenant bien garde ne pas toucher les Cela estant fait il faut repasser auec l'autre bout qui n'est pas pointu, a l'opposite

vailleaux (permatiques.

de la troisieme partie & puis recommencer au commencement de la quatrieme partie,

#### Traité Nouneau

des mesmes trous , comme si on vouloit faire vn aneau entortillé en cette forme. OOO. Plusicurs croyent que c'est mal

fait de tant paffer & repaffer ; au contraire c'est fort bien fait, car parce moyen les vail+ feaux spermatiques penuent bien mieux paffer , pourveu que l'intestin ni puisse paffer.

Cela estant fait il faut vn peu limer les bouts du filet d'or & les bien approcher les vns des autres, anec des petites tenailles mer eg oupincettes propre a cela, afin qu'ils ne app-ocher Les bouts piquent les parties circonvoifines, puis il dse files faut remettre le processus dedans son lieu, d'oren-& laiffer confolider la playe, car l'or & le femble. plomb font fort fami i'rs a la nature: -

### Autre maniere de faire le Point doré.

#### CHAPITRE XIII.

V'elques vns au lieu de fe fernir du filetd'or, fe feruent d'vne fiçelle, laquele le ils paffent par vne aignille , puis paffent plaisante cette aiguille, en l'aine dessous la production, par le milieu d'vne marque faite expres pour cette intention, puis on liè le bout de cette ficelle fur yn petit morceau de bois

maniere

de faire

le point

d'ore.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 35 bois qui y est couché par dessus, & de jour en jour on setre la figelle, jusques a ce que petir a petir elle air coupé le processis & la peau de l'aine.

# De la maniere d'extraire le testicule.

### CHAP. XIV.

S tous les suddis remedes ne servente de ...

sien a cause de la trop grande ruprute quand eight de la trop de la cause de la companion de la companion de la companion de la capacita de la capacita suddistassente qu'elle sur entercement guerie praire le alors il sudda venir à l'amputation du te-splieute, sticule.

Or cette operation le fait diuerlement, qu'ul-ce cat les vns apres auoir lejtué le malade qu'il faux des lives qu'il qu'

de l'encre, puis vn feruiteur poulle & comprime l'intellin dans le ventre, e de peur qu'en failant l'operation il ne retombes comment puis font vne incilion ance vn fealpel ou flee vn rasoir transversalement en l'aine, inf. faire l'inques à la production du peritonne, puis élian,

36 Traite Nouneau

auce la main gauche ils tirent dehors la dite production en la descharanan ance oqu'il fait man droite des tuniques des testicules & le qu'il fait persione du Scroum apres cela ils tirent que Pin-dehorspar le melmetrou le testicule, puis signe est ils lient & atracher en deux endroits les faite. vaisseaux spermatiques, & auce des petits

faite. vailseaux spermatiques, & auec des petits cochets, on par la construc ils font rela manie, joindre les dittes parties ensemble, c'est a dire d'arra, re qu'ils recouient ensemble le pracessire se testicule, auec vue aiguille ensiée de 
filtetales. d'édus cette coulture, a lasauori la proest dessus eutre cousture, a sasuori la pro-

duction & le testicule.

Et pour empecher l'hemorragie, & pour qu'elt co qu'il faut faire reioindre & agglutiner ce qui est incité, ils appliquent dessus la partie incifée faire bons le fer rouge, & puis font vne ounerture en embecher L'hemayla partie inferieure de la bourse, dans lazagie de qu'elle ils mettent vne tente, afin de donpour faire ner issue a la matiere: ou bien au lieu de la reioindre lesparties tente ils lailsent pendre vn bout de filet incifées. hors de l'ouverture.

# Autre maniere d'extraire le Testicule.

# CHAP, XV.

Ca la fin remarqué qu'en faisant que la l'incisson en l'aine, il lutuenoit toussours susdite de tres-grandes inflammations en l'aine, au Scrotum, & ala verge, que fi on n'y metnie e dextoit promptement du remede la grangrene traire le sesticule fi mettoit d'vn costé & d'autre accompan'est pas gnée de plusieurs maux, pour donc subvenir a de tels accidents, il y faut proceder combonns. me il s'enfinir.

Apres auoir fitué le malade comme l'ay reduction desia dit, & ayantremis l'intestin dedans le de l'inteventre, il faut qu'vn seruitur presse auec sin dans deux ou trois doigts dessus l'aine pour em- le ventre. pecher qu'il ne retombe.

Puisil faut prendre le testicule auec deux la manieou trois doigts de la main gauche, en la re de faiplus basse partie du Serotum, & le tenir resortir le bien ferme, puis auec la main droite il hore du faut bailler deux ou trois coups dessus, auec Serotum, vn scalpel ou rasoir, jusques-a ce que le testicule forte dehors.

Cette methode est beaucoup meilleure,

Traité Nouneau.

que cette & n'est pas si dangereuse, ioint qu'il n'y methode arriue jamais de si grand flux de sang comest beaume à l'autre, & on n'a pas faute de mettre coup meilleure que l'an.

vne tente dans la playe , au contraire les humeurs fortent d'elles mesmes, pourneu qu'on l'aisse pendre hors de la playe vn bout de filet , & parce moyen elles ne peuuent

causer aucune inflammation.

au'est-ce Le testicule commençant a sortir hors qu'il faut de l'ouuerture il ne faut pas laisser de le tifaire lors rer d'auantage, sur tout si la rupture est que le tebien grande, car iclon'la rupture il faut Hicule tirer l'Epiploon, & en tirant ledit Epiploon comměce & fortir. il le faut descharner, & separer du Serotum

comme nous auons defia dit cy dessus , & tongilles le tirer iulques a ce que ce foit afsez ayant pour ainsi l'Epiploon, ille faut prendre auce des prendre tenailles hermeres, & le tenir contre le ventre; en l'estraignant assez fort, & il le

faut tousiours tirer de peur qu'il ne retomles tebe dans le ventre. I nailles

Remarqués cependant qu'il faut que les

mol.

desquelles tenaille doivent estre garnies de quelque on fe fert en cette chose de mol, afin d'éuiter l'inflammation operation qui pourroit arriuer a caufe de la douleur doinent & contufion que ladite tenaille causeroit si eftre gar elle n'estoit garnie de quelque chose de nies de quelque chole de Gela estant fait, il faut auoir vne aiguil-

le vn peuplus longue que le doigt, & vn

de plusseurs Operations en Chirurgie. 59 & peu courbe vers la pointe, laquelle aigunt. de ferspit le doit eltre enfilée de filer commun en troi giste aou quatre doubles, & de la longueur que me La-Pon ingera eltre a propos, lequel filet doit quette tilte oint aucé du beurre frais non falé ou faunfaire bien de l'huile rolat.

Puis il futt paller cette aiguille au mil. 

lieu du Peritoire qui efta u delius des tenail- La mailes, tant prés d'icelles que vous pourtés, re de capuis il faut environner la moitié du Peritoir des le rece de reparte voite aiguille par le meline révisité.

trou ou vous l'auez desta paisée, cela fait il faut prende le bourd u liet qui n'est pas passé, et le lier ensemble aux el raurrebout ou et l'aiguille, en comprenant l'autre moitié du Peritoire.

Tout ceci eftant fait il faudra vn peu pie onellargit les tenailles afin de mieux ioindre urir les ses parties du Peritoine, mais il faut prendre tenalet garde de ne le pas trop ferrer, de peur d'ecci. Pour ter de l'inflammation, & il ne le faut au finishet le pas trop lafcher afin de ne caufer de l'heperitoine, motragie.

Ces chofes estants ains obseruées il sur estamos couper le pretions bein proche du files il faut pourveu que le file tienne bien ferme, car printine, sur printine, sur printine, sur printine, sur printine, sur le moindre effort que le malade froit , & ainsi l'intestin descendrais par le moindre effort que le malade froit ; de ainsi l'intestin descendrais et se sergium.

Yz 40 Traite Nonueau

essentiPuis il faut appliquet deflus la partie le faint de fanda, ou bien comme j'ay di cy deflus la partie de l'huile rofat tout boüillant, en le donnant bien garde de ne pas toucher les parties circonvoilines, sk laiffer pendre hors de la playe vn bout du filet lequel feruita de tente: alors veus n'auce qu'a outrir les tenailles, sk le perutene retournera de luy mefine dedans le ventre.

# Des accidens qui arrivent a l'Enterocele.

#### CHAP. XVI.

pourque, TL arriue sounentes ois qu'on ne peut rerintessim metre l'intestin dans le ventre, a cause qu'il adhere trop a la production du peripue sire : toine.

remu das La cause de cette colligence se faitpar le ventre. quelque exceriation, comme quand l'indela cau- testin descend & qu'on le remet auec quel-

fe de seuse que grande violence, ou bien lors que la whbran- dilatation ou rupture est si grande que les incestins sciournent trop long- temps, dans le Seresson. Se que la matiere écale delécad & remonte sans aucune resistance, ce qui cause a la fin quelque matiere visqueuse qui

les attache ensemble.

Quelques

de plusicurs Operations en Chirurgie. 41

Quelques vns voyant que cette tumeur erreur de n'entre point dedans le ventre, quoy qu'on oper-la presse auce la main, ou soit que le mala-reurs. ce soit couché, croyent que c'est cette Hernie que les Grecs appellent Sarcocele car cette Hernie ne r'entre pas dedans le ventre soit que le malade soit couché, ou qu'il ne le foit pas.

Mais pour mettre difference entre ces ference deux fortes d'accidens, il faut scauoir que le entre estre Carcocele, est fort dur, scirrheux, & sca-adheranbreux , lequel semble estre discontinué ; au ce de le contraire en cet accident dont je parle, sarcosel on voit en haut vers le processus vne certaine espece d'elenation à cause des intestins

qui y font tombés.

En cet accident il faut confiderer deux disations indications la premiere est qu'il faut tâchet en cet acde remettre l'intestin auec tout ce qui cident. pourroit estre tombé dans le Scrotum. La seconde est que si cela ne le peut faire, de la se-a cause que l'intestin est tourné, desorte dication que la matiere fecale y est enfermée, enratinealors la main n'y les medicaments ne feruent de rien, neantmoins on pourra auoir recours a quelque clifteres acres, qui irritent & incitent la nature à ramollir les matieres & ventofitez.

#### De l'Operation manuelle de cet accident.

# CHÁP. XVII.

tion.

Voicy comment il faut faire cette of peration, il faut premierement faire faire cet- vne bonne ouuerture ou incision en la plus basse partie du Scrotum, puis ouurit le procoff se prés du testicule, on le peut couper deffus l'ongle, ou tirer les tuniques auec des crochets, & les couper peu à peu, iulques a ce qu'on loit venu a l'inteltin, mais il faut bien prendre garde de ne le pas couper; cela fait ilfant doucement descharner auce les doigts l'intestin d'auce le proceffies, cette separation se pourra facilement faire, pourueu qu'on y procede doucement & d'extrement, puis il faut remettre l'intestin dedans le ventre, & proceder en la cute comme i'ay dit cy deffus.

commons il faus auce le Processin

#### Autre accident qui arrine à l'Enterocele.

#### CHAP. XVIII.

"Ay dit au chapitre second en paelant des signes de l'Enterocte , que c'elloit qu'agno vue turneur qui tantost crossiloit, & qui reste tantost le diminuoir , ce qui artine lors qu'il est tombé vue trop grande portion de l'intestin dans le Scrotum , o ubien que l'intestin dans le Scrotum de l'intestin de

De force que fi l'intellin eft trop rempli le sect, de matiere fecale il ne peut de moins par dants qui fapefanteur, de dilater ou rompre le peri-lorsque toine; & pat ce moyen tombet dans la ca-les interpactie dus resums, deforte que ni l'intellin film font il a ditre matiere, ne peutent repafite par trop, semi-let une du petrioner, tellement que le mala-li de made et peut aller a lelle , de force que cette cites finantiere chan ainfi recona caule vne inflammation aux intellins, & aux parties circonvolines, que fi on ni met promptement du tremede, la grangene fi met en peu de temps, & voitre malade s'en va, ad partes.

les signes
pour connoistre s'il
faut toucher a cet
accident

on non.

accident ifaur vier de quelque precaution, y
car fi le Serotam ett changé de couleur,
y
celt a dire fi on remarque qu'il foir denem
u, noir, livide, ou bleu , & que la rumeur
r foir plutot et rong qu'en long , & que la
bouche du malade foye liuide, & que la
bouche du malade foye liuide, & que le
malade fente de la froideur aux extremitez,
autec l'Typolyma, alors il ne faur tien entreprendre, mais fi la tumeut n'apas changé
de couleur, & qu'elle foir plutott en long
qu'en rond, alors on pourra autoir recours

doux indications ille presente deux sortes d'indications.
La Premiercest qu'il faut tascher s'il est

en est ac. La Premiere et qu'il faut ratcher s'il eté.
eident, possible de remettre l'intestin de dans le
5 ventre, ce qui se fera en couchant le macomment lade a la renverse dessiss banc ou table,

il faster a materia e retrette dellus VII Danc ou tradici mattre in relle force que le malade air la tecfic bien l'implia balle, & la partie malade bien haute; puis dans la il faurprendre la turneur auce les mains, & cuentre tendre de la faire fenere peu a peu, & en mesime temps la matiere secale, en mettant vn ou deux doigts dessona la turneur & le pouter ainsi dedans le ventre ; & tour ce qui

mefine temps la matiere fecale, en metrant vin ou deux doigs deffous la tumente X le pouterainfi dedans le ventre, & tour ce qui poarroit effre tombé dans le Sesouum, cecpondant if fain prendre gated en ceau-let aucune contufion ou meutriffare, a l'Intettin de peur auffi de ne caule, de l'in-flantmation & puis la gangrene.

de plusieurs Operations en Chirurgie 49 On se pourra aussi seruir de quelques

clifteres forts & acres , afin d'inciter la nature a fe defcharg «te ces ventofite», qui font contenues aux inteffins , car auce la qu'anue mariere fecaleil y a ordinairement des ven toftere. Cependant il ne fe fur pas troy ferelletoftere. Cependant il ne fe fur pas troy ferellecitiere de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio

Be. Fol. mal. & bifmal. origani, calaminihes

cammolle aneth. ana. M. j. seminis senugreci. anis cuminis, & carni. ana. Ziiji

feminis ruta

bacarum lauri contufar. 3j. B. Fiat decottio ad ff.j.in qua diffol.diaph. 3B

Confest. de baccis laurs. 3. y.
facchair rub. mel. rofats. ana. 3. j.
eleirith & nucum. ana. 3. B.

Fiat clister.

La Seconde indication efteque fi tous 9 nº 6716 ecc remedes ne feruent de rien , a caufe par l'iffant que l'intefin eft quelquefois tourné, de tous est forte que la mari, re ficale n'en peut fortir \*\*emodet alors ni la fituation, ni la main, ni la di mefernent uerlité des medicaments ne feruent de titus, de riva.

Traité Nouneau de sorte qu'il faut venir à la dernière , exeremité, c'est a dire a l'operation manuelle.

# De l'operation manuelle de cet accident.

#### CHAP. XIX.

Our bien faire cette operation il faut Por bien faite le malade comme nous auons defia dit. Puis faire vne incision en l'aine, insques a la cauité naturelle, en fe donnant bien garde'de ne paspiquer l'intestin, l'incision estant faite il y faut mettre dedans vne canule de la groffeur d'vne plume d'oye, ronde d'vn cision. costé & caue de l'autre, & la pousser dans le processis & faire vostre incision sur icelle,

cher l'intestin.

L'incision estant assez grande il faut resin dans duire l'intestin dedans le ventre, puis faire deux ou trois points, d'aiguille dedans le

en prenant toufiours garde de ne pas tou-

processis, & acheuer ainsi cette consture que les grecs appellent gastroraphie, mais il faut condre le en faifant la cousture il faut prendre vne bonne partie du processus afin de rendre le paffage plus eftroit.

Ou bien on la peut faire ainfi, ayant sçitué

de quelle maniere il faut faire l'in-

de l'inte-

de plusieuri Operations en Chirurgie. 47 une nadade & ayant fait vne incilion en l'ai maniero ne comme i evien de dite, y il flutu autoir vn maniero petit batton qui foit vn peu applait deffuse estre ope & rond vers le bout, & paller ce batton par ration. l'incilion en baut, en tre le persione & la chair du Scroum & l'aine, & couper cette chair destits ce baston, afin de ne pas blesser le persione & les intestins, l'ouuerture estant allez grande, il faut tacher de remettre l'intestitu dans le ventte.

Mais s'il artinofe que l'intettin ne le pout grégher remettre a catie de la trop grande quantité g'ut l'faut de marière, pour canie de quelque inflamme finettin marion alors il faudar couper le peritoine ne spoud deffus l'ongle, sen leuant les tuniques auce romattee des petits crochets, & puis le couper inf. a causé ques a l'intettin & les tuniques du pertione, grande ques a l'intetti ne les tuniques du pertione, grande el sur proposition de la trop et de la companie de la companie

dre difficulté , l'intestin estant remis , il

faut proceder en la cure, comme i'ay dit ci

de la

de cette

hernis.

#### De la Curation de l'Hernie Omentale, que les Grecs appillent Epiplocele.

#### CHAP, XX.

qu'eff-ce (Ette Hernie est appelle Hernie Omenie qu'hernie tale parce qu'elle est faite par la cheute omentale. ou relaxation d'vne petite portion de l'omentum dedans le Scrotum.

Ie dis par vne petite portion de l'omence de l'o- tum , parce que ledit l'omentum est attaché mentum. au fonds de l'estomach & al'espine du dos,

C'est pourquoy cette Hernie se fait plustoit par la relaxation du peritoine, parce que comme l'omentum est gras , il le peut plusause de stoft relascher & dilater que rompre le peritoine, c'est pourquoy on peut attribuer la caute de cette Herme, a vnc trop grande

humidité de ces dittes parties, ou bien a quelque violent excés, comme d'auoir trop crié ou fauté & choies semblables. Les signes Les fignes de cette Hernie sont quasi de

de l'Her meime, que celle de l'inteftinale; car il y nie omen a vne tumeurau Scrotum, cependant il faut tale. remarquer , que la numeur de l'Hernie omentale est beaucoup plus molle que l'autre, car il semble en y touchant dessus, que de plusseurs Operations en Chirurgie. 49 l'on touche dessus de la laine, & elle est moins douloureuie, muiselle s'en retourne fort dissicilement & sans faire aucun bruit.

Pour paruenir a la cure de cette Hernie deux dientie il se faut proposer deux indications.

La premiere est qu'il faut tascher de re-raise de mettre l'omenum dans le ventre, ce qui le cette her-pourra facilement saire aucc la main.

La feconde est qu'il faut empelcher qu'il redutitos ne tetombe : c'est pourquoy on se pourra de voin-feruir des adstringents : mais comme cette inm dans Hernie est causée par vne humidité ou par le venteu vne substance onchueuse, qui relache & dilate puillamment le peritoine, aussi demande elle des remedes plus dess'eccasis que PHernie intelinale, c'est pourquoy on sait grand estar du suivant emplastre.

44. Aloé, malecor, in vino nigro, his fabrielivar. facci hypornfita. cius lina, thuris glatinis fabroris, ana part. aqual. chap, 34glaten, paffo incoguatur ad integram. Calmediffollationem post teratur in mortario shies.

Apres auoir fait la reduction de l'omentum il faut appliquer dessus la partie cet emplastre, auec vne bonne compresse accompagnée d'yn bon bandage.

# De l'operation manuelle de L'Hernie Omentale.

# CHAP, XXI.

TL arrive fort rarement que cette forte d'Hernie a besoin de l'operation de la main, parce qu'elle se guerit souuent sans hernie le querit en venir a cette extremité là, car ayant re-Conuentemis l'omentum dans le ventre, & appliqué fois par desfus la partie le susdit emplastre, auec l'applica vne bonne compresse, & vn bon bandage, zion des remedes. & en faisant tenir 40. iours le lict au mala-

Cependant s'il estoit tombé vne trop Celle au lin 7, ch grande pattie de l'omentum dans le Serotum, alors Celse commande de la cauterizer, 25. afin de la faire mourir, & estant morte elle tombe d'elle mesme, mais auant que de

la cautérizer il la faut lier; puis empûter & de quelle cauterizer, aucuns la coupent fans la lier maniere il faus n'y cauterizer, ce qui caule vne tres gran-CRHEOVISE de bemorragie & le fang estant retenu dans' cette Her. nic.

ventre le pourrit, & cause de tres grandes douleurs; & symptomes, & a la fin la mort.

Donc pour bien faire cette operation il faut premierement faire vne incilion, com-

de plusieurs Operations en Chirurgie. 51 me l'ay dit enparlant de l'Hernse intestinale, comment, puis il faut prendre l'onnenum & le tiret faire cetta hors de l'ouuetture, & le lier tant haut operation que vous pourrez, & le couper bien prés de la ligature, & puis le cauterizer, l'ayant cauterizé il le faut laisser retourner dedans le ventre, & laisser pendre vn bout du filet hors de la playe, afin de donner issue a

la mariere. Remarquez qu'il arriue quelquesfois pourquoy que l'omenium ne peu pas sortir parce qu'il l'omeniu adhere trop au perstoine, si cela arriue il faudra lier le peritoine & l'omentum entemble, quesfois le plus haut que vous pourrez, puis le cou- forsir hors per & cauterizer , en le donnant bien gar- du wentre de de ne pas couper l'intestin, ni qu'il sente la chaleur du feu , carla mort s'en enfuivroir.

#### Dela Curationde l'Hernie Aqueuse que les Grecs appellent Hydrocele.

#### CHAP. XXII.

T l'drocele ou Hygrocele, est une tumeur dessissen aqueuse au Scrotum, on peut dire de l'hyque c'est un symptome de l'hydropysie,

Traité Nouveau.

afcite, ou bien vue hydropisse particulie-

Les causes de l'Hydrocele; font (selon

14. ch.12. Aece, occultes ou manifestes.

La cause occulte se tire des vaisseaux qui descaules font naturellement pleins d'vne humeur aoccultes queule. de mani-

La cause manifeste est la percussion ou festes de cette her-

nie.

collision & fracture des vaisseaux qui sont aux testicules, carces vaiffeaux souffrants vne de ces incommodités causent que le fang qui s'en va dans les susdits vaisseaux se convertit tout en eau, a caule de la foiblesse de la partie receuante, àce suiet Guy de Cauliae adiouste encor vn autre, qui cit vn certain vice du foye ou de la ratte, a raison dequoy se fait vn amas d'vne humidité aque l'enu queuse dans les Hypochondres, laquelle humidité tombe petit a petit dans le Serotum,

qui est dansle c'est a dire entre les tuniques que i'ay nom-Scrotun mées cy deffus Darios & Elyiroides, & quelest quel quesfois cer'eau est enfermée dans vn cerquestois

petite

tain cyfte , comme l' Atheroma & Steatoma. dans une Aèce distingue cer'humeur par l'humeur peccante , c'est que si la tumeur est

реан. rougeastre & paste, c'est signe quelle est les figues caufée par vne trop grande replection des veines ; & si la tumeur resemble a de la lie, moir d'on c'est signe que le mal vient de percussion, certe eau elt venice. & fi elle eft blanche c'est signe qu'elle est

de plusieurs Operations en Chirurgie. 53 causée par quelque dessaut du foye, ou de la

Les Signes pour connoiître cec'hernie les fignes font ceux ci, c'eft que l'on voit vne tumeur de l'operance & Inflatte, & qui par fucceffion de devale, temps fe rend dure a caufe de l'abandance d'eau, qui caufe cetre tention 3, & fi vous metrez vnechandelle a l'oppofite de la partie comme i'ay dit au chapitre fecond en parlant des fignes engeneral de cer'hernie, vous verrez la chandelle au trauers de la tumeur 3 comme li vous regardiez au tra
general verse d'ivente de l'ectre d

uers d'un verre ou d'une corne delliée.

Auant que de venir a l'operation, il flux qu'il faut talchet d'evacuer l'eau qui fui entre la vente & les bypachadres, & en general de vonte & les bypachadres, & en general de vonte le refle du corps. Pour évacuer l'eau à eppera-life faudra feruir des remèdes refolutifs & tion de la reperculifis. Comme par exemple.

"mâth."

R. Stercor. bubul. H i. puluer. (umin. Z. j.

baccar.laur. Zß. Frat Cataplajma.

Ou bien celle ci.

R. é baccis lauri, farina fabar.
finugr. fulph. cumino.

ammoniaco. terebenthine, sape, & oxymelite, cum oleo, laurin. simul mixiis. 54 Traité Nouneau

AMANT Mais auant que d appliquer ce cataplafque d'appliquer les els fetta pas mauutais d'ojudre la parcaiaplaf et auec de l'huile de tite : la partie estan me il faut ojunte auec cer huile ; il faudra appliquer sindre la vu de ces cataplasfines ; apres cela on se partie pourra aussi feruir de quelque somentation, mahade.

faite auecla decoction de poulsor de calaminhe, d'origan, de semences d'anis, de se semensis, de carrottes, de cumin de carrui. C.C.

de la cura Pour ce qui regarde la generale cure du en genecorps, on se pourra seruir de la decoccion ral de de salse pareille & se servir des dinretiques tout le & purgatifs, & principalement des remedes, corps. bydragogues, comme le sirop rosas laxatif, bir.fabri pillules de cochia, mastichina, & élephangina cius lina desquels on pourra donner vn ou deux chapas. scrupules auec quelques grains d'élaterium.

# De l'operation manuelle de. l'Hernie Aqueuse.

#### CHAP. XXIII.

simeries

Es Autheurs. Ne sont pas d'accord
maniers
trouchant cette operation, cat Autenu
appliquer en l'aine le fer rouge, afin de
reflerer & rider la partie, afin que l'eau ne
puilléplus tomber dans le Septime.

de plusseurs Operations en Chivargie. 58 2 Guidon se servoit des tenailles à secton, & la manie-

palloit au trauers d'icelles vne aiguille ar-te estra dente de la longueur d'un demipied, enfilée hennie, de de foye en lept ou huit doubles & la palloit lon Guids vifte au trauers de la partie, de peut qu'elle ne se réposidit dedans l'eau,

Les autres ouurent le Serotum auce le eautret potentiel, mais la meilleure methode de toutes est celle-cit. C'est qu'il faut faite vue ouuteture, on incilion, (auce vu methode bistori où vue lancette, ) au Sorotum, en treassiriet prenant garde de ne pas offenser le testicule eatte open'y les vailléaux spermantques. & déterauss: , ration.

Cette incifion doit estre de la longueur d'un doigt, afin que si l'eau estoit ensermée de la gradedans un peut cyste comme i'ay dit cy l'incissen de dessay il le faudroit aussi inciser.

Celfe,dit que fi le malade est en aage d'en- du lieu fance , il faut faire l'incifion en l'anne , es, ou il faut repousser l'eau en haut vers l'incision, mais i'i faire linest plus anancé en aage , il la faut faure au fonds du Scrotum , & en tirer l'eau , qui

croupit en cette partie là.

Puis il fauf Janet la partie aucc de l'eau qu' pes dide, ou nitreufe, mis il ne faut pas lailler y d'Atau croupir cette cau dans la partie, de peur faire a que par son séront elle ne corrompe le tineifon efficiel e no bien qu'il sy faife quelque ésfaire amas d'un, humeur groffier qui pourroit produire certe Hernie que les Grees appel-

sent sarcocele.

Cela estant fait il faut mettre dans l'incisson une tente de charpie trempée dans de l'huile rosat tiede.

de l'huile rolat tiede

Gal.au.

Galien commandede tenir la partic oulin. dela uerte auce vne canulle d'argenç ou de
muthode, plomb, & appliquer par deflus vn adhrinchap·1;
gent , jusques à ce que le fonds de la playe,
commence a suppurer qui est vu figne tres
assuré que la tunisque se pourrit.

## De la Curation de l'Hernie charneuse, que les Grecs appellent Sarcocele.

## CHAP. XXIV.

de la definition du farcocele.

E Sarcoccle le peut definir en vne tumeur feirrbeuse contre nature dedans le Scroum, causée par la fluxion des humeurs, groffieres, vifqueuses, & froides, qui le lettent autour des respecules, & quelques-

fois en leur propre substance.

deux fir- Mais remarquez que ces humeurs grocter d'ha- ficres sont de deux sortes, asganoir des pimeurs en miemestres de des melendologues lesquelles cette berestants extraordinairement déscelées engendrent des durctés seinbeusses, aux autres parties du corps , & des durctés tres-dan-

gereuses

de plusieurs Operations en Chirurgie. 57
gercules autour des sessieurles en manière Galante,
dippenfarcos, one devernée car telon Galein lin, de le
tonte tumeur seirrheuse proxient ou de la bulle methode
noire, on de la pituite, ou de toutes les deux chap. 14mussière en millère en semble.

Les fignes de cette Henrie font que l'on des fignes voit vue dureré au Serosum, fans douleur & du fignes voit vue dureré au Serosum, fans douleur & du fignes exquife elle est dénuée ou prituée de l'entimére, & fecte durerée l'ét faire par quelque humeur melambolique, elle lera d'une couleur vupeu lluide, & si elle est engengée de la pituité, elle ne change point de la couleur de la peau, & si c'est la melambolie aduste, à la tumeur sera fort inégale ; ici dure, & là mullea accompagnée d'une douleur responjanne.

Gependant il faut encor remarques, que certe humeur pituiteufe, qui produit cette timeur. I n'elt pas cette piunte naturelle, feoide, humide, & fibrile, de laquelle elt compofée cette timeur que les Greez appellent Oèdena, muis bien va autre péchante en qualife l'aquelle el froide, humide, & fibrile qu'elle eftoit auparanant, est deuenté groffiere, gluante, froide, & ex traordinairemendeischée, ainfi qu'il noise ell delaté par Calien, en fontune das tuments contre nature au hopure 9.

En la curation de cette Hernie il faut

Traité Nouneau 58

les indidie Parcorele.

auoir les mefines indications qu'en celle du suratives fourthe, car il faut premierement, ofter ou corriger les causes externes, & pour ce faire il faudra choisir vn air pur & subtil, chaud, & humide, & fuir celuy qui est espais & nuageux, & toutes viandes grofficres & terreftres, comme les legumes, du vin noir & councrt, du fromage & du pain noir rempli de fon.

vegime de qu il faut ordonner au mala de.

internes.

Mais il faut vser des viandes qui sont faciles a digerer & qui soyent vn pen humides & attenuatiues, comme du pain de pur froment , dubon vin blanc & lubtil, des œufs frais, des poulets, de la borrache, & des épinats, on aura aussi soin d'éuiter le trop long fommeil , l'oissucté & la trifteffe.

descriptio

Ayant ainsi disposé les causes externes; descauses il faudra remedier aux causes internes, c'est a dire que si cette humeur melancholique, qui caule cette Hernie vient de quelque vice de la ratte, ou du foye, ou des obstructions des veines hemorrhoydales , il les faudra ouurir, & y appliquer des sang-sues, & fi cette melancholie est noire, il la faudra, évacuer par la phlegbotomie & purger cette humeur melancholique auec fenna, polypod, bellebor , nigro , confect , hamech , desquels medicaments on pourra faire yn bolus me-· ianaboque.

BL. Electuar.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 99 Re. Electuar , lenst! Zvj.

flor. Cassia. Confect, Hamech. ana Ziij.

(um facchar , fat bolus.

Cependant il faut remarquer, qu'auant que de purger cer'humeur, il ne fera pas maunais de le preparer auec des remedes hir.fabris artenuants & humectants, comme par ex chat 19. emple, le firop de succo. borrag. buglos. &c. des tu-

Mais si cette Hernie, est engendrée d'v- mears ne humeur pituiteuse, alors il ne faut pas contre faigner, mais il faudra preparer cette hu- nature. meur pituiteuse, auec des remedes attenuants & déterlifs, comme par exemple, firop de hyfop. de betonic. & stachade , decost , calaminthe , oximelite simplic , & Composimelle rofat. decost, pulegy.

L'humeur estant preparé, il le faudra évacuer auec agarico, pilulis de agarico, mesua, pilulis de Hermodactylis, hiera

Ayant purgél'humeur il faudra fa re des revulsions vers la partie oposite, comme par frictions , bains & des onctions chaudes & resolutiues.

Mathiole dit que la poudre de la racine Mathiole d'arrefte-bouf prise durant quelques mois, liure 3. à la vertu de consumer le Sarcocele , & dit chap. 18. d'en auoir veu guerit vn que les medecins ne pounoyent pas guerir, finon en le faifant couper.

Traité Nouneau. Enfin fi le surcocele est engendré d'une il faut humeur melancholique froide, feche &c graiter le groffiere, il fe faudra feruir des remedes Carcoccle lorsqu'el eschauffants , attenuatifs , & humeclans. le est en-Et ii elle est engendrée d'vne humeur gendrée

pituiteuse, qui cit froide, grofficre, gluante d'un hu & tenuë, alorsil se faudra seruir des remedes eschauffants, attenuatifs, incitans, &c deterfifs.

9:40,014 pituiteuse

De forte que l'on peut dire en vn mot, qu'il faut eschauffer la partie affectée, qui en quoy est devenile intemperce, par la froideur de consiste la cure du l'hameur qui influe ou qui s'est amas-Carcocele. fée en icelle, de forte que ces susdites indications se peuuent rapporter a ces deux points, ascauoir qu'il faut r'ammolir & dissiper insensiblement.

## De l'operation manuelle du Sarcorele.

## CHAP, XXV.

Ette Hernie se guerit fort rarement le querit il en faut ordinairement venir a l'operadifficiletion de la main, qui se fait comme il s'enment par des medifirit. caments.

Il faut premierement tafter auec les doigts, de plusieurs Operations en Chirurgie. 61 qu'est-ce doigts si cette chair contre nature, qui qu'est gaus'est amassièe en cette partie là, cst adhe-spaire arante autour des tuniques, des sessiones nans que ou bien si elle est autour des sessiones est sesmesimes & st elle est adherante peu ou béau-cette opecoup, à la sibitance de la partie.

Ayant remarqué ces chotes, il faut incide quelle fer tout le Seroum ituques a ce qu'on foit manière venu a cette chair fuperfilis laquelle ayant l'faut apperceite, il faut d'aboid voit de talter, fi faire et elle eft bien adherante a la partie, ou non, se se che elle elle parte peu à peu auce les doigts, ou auce le manche d'un petit tealpelle, mais fi elle fet bien adherante a la partie, certes alors il de faudra refoudre de la couper auce les vailleaux fipermatiques, de le tellicule, car fans cela iln'y a pas moyen de parueir a la cure.

Or pour bien extraire le reflicule voici comment comment il faut faire il faut premierement il faut itterhors de l'incilion les vailleaux foerna, avracher tiques & le reflicule, & les bien lier en l'apitule femble, puis il faut couperproche de la ligature & cauterifer la partic, & pour ce qui regarde le refle de la cure, il y faut proceder tout de meline comme ent Enterocele, dont nous auons parlé ci deflus au chapitre 11.124, 13.14. & 13.14.

## De la Curation de l'Hernie venteuse que les Grecs appellent Phylocele.

## CHAP. XXVI.

Myfocele, out Hernie venteufe, n'eft au-I tre chose qu'vne tumeur au Serotum qui est remplie de ventofuez. l'ay parlé des fignes de ces Hernies au

descruses chap. 4.0ù pour brieueté nous renuoyons le lecteur. cele.

Les causes de cette Hernie sont deux, la premiere est externe & la seconde est in-

delacas le externe des phylo. cele.

La cause externe n'est autre chose qu'vne pituite groffiere prouenante de quelque air froid humide & nuageux, & des viandes groffieres, comme legumes, fromage, chatagnes, escargots, &c Le trop manger & le boire, l'oissueté & la vie sedentaire, le trop dormir, la suppression des veines hemorrhoydales, la constipation du ventre, & finalement quelque coup ou contufion.

La cause interne prouient aussi de cette le interne pituite, laquelle delcend quelquefoisde la du phyfo teste, & quelquefois cette caute vient ausli de l'intemperie froide & humide de l'estocele

mach.

ele plusieurs Operations en Chirurgie. 63 Voila, en general la cause de cette pituite de la cangroffiere : dont l'vne est vne chaleur dimi- se de cette groffiere : dont i vine est vine chaleur dithi-pituite nuée, & l'autre la denfité ou imbecillité eroffiere. de la partie, ou elle est accumulée, & qui

fait qu'elle n'enpeut passortir. En la curation de cette Hernie il fant dicationi

confiderer deux indications.

La premiere est qu'il faut corriger les en ceue caules externes, ce qui se fera en failant ele- bernie. ctiond'vn air, chaud & fubtil, les viandes doivent eftre chaudes feches & attenuati- moyen on ues, & qui ayent la vertu de distiper les ven- corrigera

Le pain doit oftre bien cuit , & pestri externes. auec vn peu de fel , & de cumin ou fenouil. en que

Son boire doit eftre de l'ean bouillie a la-confife la quelle on adioustera vn peu de fenoiiil & seconde

Laseconde indication est qu'il faut for-hernietifier la chaleur naturelle qui est diminuée.

A quoy feruira grandement l'vsage d'vn bon vin aromatique, comme ausi les poudres aromatiques, comme, diacyminum, discalaminthes, diagalanga, aromaticum, rofatum mains. &c.

Pour ce qui concerne la plenitude de tout le reste du corps , elle se guerira par l'evacuation , ce qui le fera en faignant ou

Cependant il faut ici remarquer, que la

64 Traité Nonneau replection qu'a caufé cette pituite geoffice, demande pluftoff la purgation que non pas la faignée, c'est pourquoy on se pourra ler-uir des pillules faires d'Agarie. Messe de Hermodartsis. & C.

Gal.au 2. liu. ad glauc. chap.6.

Ayant ainfi pourueu tant aux caufes internes, qu'aux externes il faudra venit a l'apc, plication des remedes deflus la partie, & pour le faite auec methode il le faut propote deux indications.

La premiere est qu'il faut rarefier ce qui est reserté.

La leconde est qu'il faut (abtilière ce qui est grofier, on distilpera l'humeur qui est contenue dans le Serotum, auce des regnetes qui ayent des parties fort subtiles, de pour r'ammollir le Serotum on le seruira du remede fuiulant compoté de poix-resines, terebenthine, de de graisse de Liuon ou de Tautrau.

Vue éponge neuvetrempée dedans la lefçine & appliquée dessus la partie, est aussi tres-excellente, & ce remede dont parle Paul Ægineta.

B. Paper. g. c. baccas.laur.num.80. nurs.3xx. aere.3v. olei.3iii. B.

On

de plusieurs Operations en Chivurgie. 65 On procedera au reste de la oure, comme en l'hernie aqueuse, dont i'ay parlé au chapitre, 22.8623.

## De la Curation de l'Hernie Variqueuse que les Grecs appelent Circocele.

# CHAP. XXVII.

Irececle est vue tumeut au Serotum, ou du circovue apparence des veines dilaces, & est.
entortilles l'une dans l'autre, comme les tendons des sermans de vigne; Car Paul & Eguerta dit que les veines ne sont pas s'eulement dilaces, mais quelles sont en quelque façon entortillées, s'aislans comme des nœuds les vus appres des autres, le squels

font d'une couleur noiraftre.

La caufe de cette hernie, n'est autre de la chole qu'un sang melancholique, noir, canse de crasse & pelant.

Et la caule pourquoy ces veines sont ain-queuse, si entortillées & noiteules , c'est l'estroite ; iaison que les membranes ont auec les veilarions, & les valvules qui sont au dedans des veines, les quelles estant dilatées , se rem-sont ainsi plissent de ce sang melancholique , & par la murnilplissent de ce sang melancholique , & par la murnilplissent, cause cet entortillement , que l'ést.

Traile Nouneau. nous remarquons aux varices.

l'ay parlé des signes de cette hernie au ch. 4. ou ie prie le Lecteur d'auoir recours,

trei indi-Il reste seulement que ie parle de la cure de cette hernie en laquelle il faut consideen la Curer ces trois indications. ve de cette bernie.

La premiere est qu'il faut repousser l'hu-

meur qui rombe dellus la partie.

La leconde est qu'il faut évacuer & deffecher, celle qui pourroit desia estre fluée deffus la partie.

Latroisieme est qu'il faut astreindre, & resferrer les veines qui sont dilatées.

· Pour satisfaire a ces trois indicarios, il le par quel faudra feruir des remedes adstringents , leffatisfera quels par leur vertu froide & aditringente A ces trois repoulfent l'humeur influente : & par leur indicariós vertu defficcatine ils épuilent & font tarir

l'humeur qui pourroit dessa estre tombée dessus la partie, & par leur adstriction ils refferrent les veines dilatées, c'est pourquoy on se pourra feruir fort heurentement, de Succus Hypocistidos , Balaustia , Gluson Pifcium, malicorium, Bolus armena, fanquis Draconis cum out albumine. & C.

On bien on pourra appliquer deffus la partie le fuiuant emplattre qui est tres-bon,

Bs. Pscis naualis. Colophania. 3111. Lytha gyri. ammoniaci bdellij.

Opoponacies

de plusieurs Operations en Chirurgie. 6/2
Oppomacis, serebenthomatlischaua. 2/3,
bobi arnem, ihmir s Janguis D'raeomes; farecocollacalois; sentasuri simplysti, s rucis eupressii; eacheoricis malt panies, vermusem
terrestrum, ana s. 3/2, glatinis pellis artesina
dilus in aqua chalis beata & aceto. Q. S.
Mijec & ji at. Emplassivam applicatur.

Se aprestous ces remedes elle ne soit pas guerie, il faudra ventr à l'operation de la main-

De l'Operation manuelle de l'Hernie Variqueuse.

# CHAPITRE XXVIII.

A Van que de faire cette operation ; il remarque faut vier de quelque precaution ; qui faire tou-elt, qu'il faut prendre garde au lieu ou font-faire tou-les varieres ; allauoir în elles fout aux veines lites su de Seratum, ou bien en la tunique la plus font las proche du teflicule, ou en la tunique, que variest, iay ci dellus nommée orginales ou finalement en la propre lubitance du teflicule. 3.

Si les variées font aux veines du Serotum. Celfe en Celfe commande de les caurerifer, auce des fina a lim petits ferrements minces & pointus, let chap-7; quels il faur appliquet dessus les veines, est ce ou elles sont le plus entortillées, les vnes au cles autres. Neantmoins auec telle addresse qu'on ne brusse autre chose que les dites veines.

Cela fait il faut appliquer par dessus des topiques, pour oster la crouste, & quelque temps apres, l'enticulam cum melle &

puis des incarnatifs.

gééfice. Si ces varies sont en la unique nomgéris lau mée Dares, il faut faire vue inclino na faire la ce, de tire dehots de cette inclinon la varies tunique & le testicule; & en separer les fout en la veines dilatées, aurec les doigts ou aurec le tunique manched vu peut (capelle.

Ayant lepare les veines, illes faut lier forteftroittement en deux endroits, & les couper par dellus ladite ligature & puis remettre la tunique & le tellicule en leur

lieu naturel.

Darsos.

Mais fi la varies ette nla tunique Etiropde, ou vaginale & qu'il ni ayr qu'vne où deux veines dilarées, alors il faudra faire vue incition en l'aine, & faire lortir dehors de cette incition la tunique & te tefficule, & een feparer las veines dilarées, & les lier commeie viene de dire & puis les couper, cela fait-il faut remettre le tefficule, & la did die la varies, et entre le etificie, & la la più groche tunique, il faudra encor faire comme la valiere, et la comme la veile de de la la varies, et per la varies, et entre le reflicule, & la la più proche tunique, il faudra encor faire comme l'ay dir, de plusieurs Operations en Chirurgie. 69 Remarquez cependant qu'il arriue quelquesfois, qu'il ni a qu'vne partie des veines qui nourrillent le resseule qui sont de unities surriquessers. Alors Paul Ægines, paul Agines, dic qu'il le frut contence de les separes, & sur de puis les empures, en prenant bien garde de ne pas offencer le resseule, lequel il faudra compette dans sun lieu narques de servette dans sun lieu narques.

# Autre Operation du Circocele.

## CHAP. XXIX.

V Ous remarquez bien que la susdite. operation est vn peu rude & disticile, que Pinne luy mesme atreste selon le rapport d'Oppius, qu'il ni auoit eu qu'vn seul Ciiu Mariui, c celuy qui a esté consula Rome par sept sois, qui ait pû souffiir quelle luy fuisent arrachée, demeurant debout.

C'est pourquoy i'espere de vous enseigner maintenant une methode qui est beaucoup plus facile, & par laquelle les malades ne tentent pas tant de douleu.

Il faur donc premierement faire vne la mabonne ouuerturei au Scrotum; , & en tirer nire de dehors la tunique & le testicule puis il faut faire estre passer vn aigaille vn peu courbe ensilée, operation

Traité Nouneau par desfous la veine, & la lier en deux endroits, bien pres l'vn de l'autre, puis piquer la veine comme si on vouloit faire vne saignée, afin d'en faire sortir ce sang melancholique & crasse : cependant il ne lera pas maunais de le resouvenir de la sentence d'Hippocrate, qui dir qu'il ne faut

Hipp.en Con liure des vice res fur la fin.

pas trop fendre la veine varsqueufe de peur de faire venir quelque vicere, a came de la fluxion de la varice, mais il la faut piquer deçà & delà, aux endroits ou il iera le plus commode,

Apres celail faut restreindre la ligature, · & la couper au milieu, & s'il y a pinnieurs veines, il faudra faire la melme chose, puis remettre la tunique & le testionte dedans leur lieu naturel, & laitser pendre vn bout du filet hors de l'incision, & proceder en la cure comme nous auons dit cy deffus.

## De la Curation de l'Hernie Humorale.

## CHAP, XXX.

Hernie Humerale se peut definir estre vne aposteme contenue dedans le Serotum, engendrée par la fluxion ou congession d'une ou de plusieurs humeurs chaudes & morale. froides

de plusieurs Operations en Chirurgie. 71 froides, qui le iettent quelquesfois ; entre le Scrotuin & la tunique nommée Dartes, ou entre le Dartos & la tunique Elitroyde ou dedans l'Elitrorde meime.

Cette Hernie fe connoistra facilement. en mettant difference de la matiere & des Galion. humeurs dont la tumeur est composée, car ad claufelon Galien toute la diffinction &differen- ton. ce des tumeurs ne proment que de la condition & nature de la matiere qui influe dessus quelque partie, & par les accidens qui y surviennent ; comme sont , douleur , des causes chaleur , froideur , dureté , molleffe , tenfion, de l'hert retinence. &c.

La cause de cette Hernie ne peut eftre au-morale. tre que la fluxion , & congestion.

Par congestion, lors que les humeurs sont che de

engendrées dedans le Serosum d'elles met-lin. mes.

Par fluxion, quand ces humeurs viennent d'ailleurs, & quelles fluent dessus la

partie affectée,

Or la congestion , se fait en la partie , a se fait la cause de la foiblesse laquelle ne permet pas congestion qu'elle puisse bien cuire & expulser ce que la nature luy envoye; & cette foiblesse est d'abord accompagnée d'vne intemperie, encor que bien souvent celle ci produit & qu'est ce

procrée l'autre. La fluxion est vn mounement de matiere xion. 72 Traite Nonneau. qui se fait d'un lieu en un autre, qui est la principale cause de toutes les tumeurs contre nature.

En la curation de cette Hernie il faut confiderer deux indications.

de cetta

La premiere est qu'il faut empecher, que l'humeur qui flie, ne tombe plus dessus la

harnie. partie.

L'autre est l'evacuation ou vuidange, qu'il faut faire de l'humeur qui y est desia influéer

Pour executer ces deux indications, on le pourra seruir des revultifs , & intercipients, car les repercussifs sont destindus par Galsen au fecond liure ad glaucon.

## De l'Operation manuelle de l'Hernie Humorale.

#### CHAP, XXXI.

L femble que cette hernie n'auroit pas besoin de l'operation de la main, maisib arriue quelquesfois que la matiere est trop rebelle, & qu'on ne la peut pas repousser C'est pourquoy on se voit souvent condulieu il faut traint de faire vne petite ouuerture, en la faire l'inpartie la plus basse du Seretum avec vne sision. lancette , en fe donnant bien garde de ne

de plusteurs Operations en Chirurgie. 73 pas blester les restrendes, & si l'hammeur est entre le Darros & l'Eliroyde, il faudra faire l'ounerture vn peu dellus le cesticule; & pour le restre de la cure elle est tour de melme que celle des autres tumeurs contre nature.

## De la Curation de l'Hernie Vmbilicale, que les Grecs appellent Exomphalon.

## CHAP. XXXII.

E relaxation du nombril qui empeche les qu'ef-ce fonctions naturelles des parties internes, qu'ex-ce principalement des intellins, phalon.

La caufe de cere éleuation, vient, lors de le cauque le pertoine bat monéril fe calche ou fe à te
qu'il te rome vers cet endroit là , lequel sombieeffant rompu y fait que les intettins où, len.
Pomenum ou bien tens deux enfemble foutent parle nombrit, a caufe de la digettion
affolble, par vaié intemperie froide, caufée par vn air externe qui entrepar là , il
s'engendre authi-quelquesfois autour du
sembrit vue certaine chair, qui eft presque

. ישינו ון מעוכנ זנו ביו פניון

Traité Nouneau.

charneufe laquelle selon Celfe, & Paul & geneta est incurable, & quelquesfois les intestins qui sortent par le nombril, sont dinorles Cortes de remplis de ventofités, & aquofités, & quelquesfois il s'y amasse du lang commenence du aux aneurismes auquels les Anciens ont nembril. donné a chacun leur propre nom Car si Hir. Fab c'est l'intestin qui forte hors du nombrel , les z parsides Grees, l'appellent Enteromphalos , prenant oper atios chir. cha. ion nom du nombrel mesine que les Grecs

> appellent Onphalos. Si c'est l'Epiploon où là coeffe qui y est descendie, on l'appelle Epiplomphalos.

Si c'ett quelque humeur, ou de l'eau on l'appelle, Hydromphalos.

promi-

12.

fort par le

Si ce sont des vents qui en sortent on l'appelle Pneumatomphalos.

S'il croift de la chair autour du nombril

on l'appelle , Sarcomphalos.

Si c'eft l'inteftin qui forte du nombril , ac. compagné d'eau alors elle est appellée,

Hydroenteromphalos.

Si c'eft l'inteftin & l'omentum qui fortent par le nombril les Grees l'appellent , Entereepiplemphalos .... S. ... de

les signes On connoilt fi c'est l'Epipleon, qui y est POHY CON

forti, par les fignes fuiuants. noifre Premierement, la couleur de la tumeur, lors que l'Epiploon est semblable a celle de la peau, molle au

toucher, auec fort peu de douleur & si on nombril.

de Plusieurs Operations en Chirurgie. 75 presse des la tumeur auce les doigts. elle r'entre deans le ventre sans faire aucun bruit, & quelquesfois elle r'entre de so mesme le malade estant couché dessus sons des

Si c'est l'intestin outre les signes suddiss, les signes la tumeur est plus sinegale, & quand on milite si perse son-presente de presente de la presente del presente de la presente de la presente del presente de la presente del presente de la presente de la presente de la presente de la presente del presente de la prese

Si cel quelque carmofite qui erois autour pour ens du nombrit, la turnetir tera dure & de plus wille grande refiltance, & demeure envo menine controit fans i entrer aucunemene dedans le quelque ventre, quog que le malade foit couché a exempti. la renverte, ou qu'en la prefie auce la acustir da main.

Si ce sont des ventostez la tumeur sera les semonles, se si on la perse auce la main, elle sont sena reiente d'abord dedans le ventre de d'abord assiste se elle retourne, se si on frappe destis auce es sont les retournes, se si on frappe dessi auce es sont les retournes, se si on frappe dessi auce es sont les retournes, se si on frappe des si on ser les sont les si on frappe dessi auce es sont les sont le

Si c'est de l'eau, la tumeur est molle, mais les spiner elle ne se diminue pas, ni augmente quand par char on la presse passe elle demeure en virmeline content de char, & d'vne couleur liuide.

Si c'est du sang arteriel, la tumeur est sorteparle grande ou petite, auec pulsation, & la nombril.

les Graes fang.

de-

7.ch.14.

Traite Nonnesu la couleur de la rumeur comme celle de la

peau, estant en son remperamment naturel, la tumeur est molle au toucher, & qui obeir quand on la presse auec les doigts, de forte que si la tumeur est petite, elle se perdra tout a fait, a caule que le lang & les esprits rentrent dedans l'artere, & ayant ofté les doigts, elle retourne d'abord comme auparauant.

De l'Operation manuelle de ces Tumeurs.

CHAP. XXXIII.

Nous parlerons seulement de l'opera-tion de celles que les Grecs appellent, Enteromphalos & de l'Epiplomphalos : parce que ce sont les plus frequentes.

fination Pour bien faire ces operations, il faut du mala- coucher le malade a la renuerle, afin de pouttoir mieux remettre dans le ventre l'inreftin & Comentum.

Alors quelques vns (comme dit Celfe,) voyans la cavité du nombril vuide, l'embraffentauec deux petits morceaux de bois, & en serrent bien les extremitez, afin de faire mourir & flestrir la partie; aucuns au lieu de fe feruir de ces morceaux de bois fe ternent

de plusieurs Operations en Chirurgie. 77 seruent des tenailles.

Les autres apres auoir remis l'intestin, autre & lomentum didans le ventre esseuent la maniere peau,oul'intestin& comentum estoyent con. d'operer tenus & prennent vne petite portion de cet- iet d'hertepeau, & paffint au trauers d'icelle, vne nies. groffe aiguille enflée d'vne petite fiffele, puis il faut faire vne incision assez profonde dessus la tumeur, afin que la peau se puisse micux agglutiner, & afin qu'on puisse mieux remettre dans le ventre ce qui en est forti ; cela fait il faut derechefrepaller l'aiguille, deux ou trois fois, ou plus selon l'étendue, groffeur, longueur, & largeur de la peau, puis il faut lier les deux bouts de cette fisselle, tant proche l'vn de l'autre quel'on pourra, la peau estantainsi resserrée tombera a la fin delle mesme auce la fiffelle.

Mais pour ne pas faire souffrir tant de maniere douleur au malade on pourra (apres auoir en ces earns ainst lie la peau) l'emputer assez prés de la 1es s'herdite ligature exterieure s & cicatrizer l'vl- nies comme il appetitus exterieure l'emputer est en comme l'appetitus exterieure s de cicatrizer l'vl- nies comme il appetitus est en comme de comme de

cere comme il appartient.

Celfe, parlant de certe operation, au meilleure.

liure ci dessussallegué, dit qu'il faut com-qu'este su mander au malade, de retenir pour vn peu qu'il faut de temps son haleine afin que la tumeux se faire pour presente aussi grande qu'elle est, puis il faut este ope marquer auce de l'encre la racine de la base ratin. 78 Traité Nouneau

ée l'homme eftant còuché a la renuerle, il faut preffer les doigts deflus la partie, afin d'empelcher que ce qui n'elt pas encot combé dehors ne puille pas tomber, puis il faut riter en haut le nambril, & la ou el la marque de l'encre le ierrer tort & ferme, auce vn filet de lin, puis soit auce des medicaments s soit auce vn fettrement chaud, cauterizer la partie luperieure, juiques ace que les meures, à au refte traiter l'vieere, comme aux autres parties cauterizées, laquelle operation, Celfe, mettoit aufil en auant pour guerit l'hydromphalus.

Mais il faut icy remarquer deux chotes,

en quoy
confisient l
les susdites operations.

la premiere est que ces sudites operations, ne tendent qu'à cette éleuation contre nature du nombril, qui le fait par la descente de l'intestin, ou de l'omentum, de sorte que si la tumeur est petite & nouvelle, ces susdites operations ne sont pas necessaires, ni elles ne font pas trop feures, a quoy s'accordent fort bien les belles paroles que Celle nous a laissées par escrit; Mais anant dit-il que de venir a l'operation, il faut auoir certains respects, & considerations, afin qu'il ne surusenne aucun danger pour lier le nombril:car en cette cure, ni un petit enfant, ni une personne en la fleur de son aage , ni un vieillard. n'y sont pas propres; mais depuis le septieme ou enuiron , insques au quatorzieme : en

Celfe sur la fin de son chap.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 79 apres ce corps là y est propre, qui est entier & fain , mais nullement cetuy qui est mal habitué, qui a des pustules , des dartres & choses semblables; on remedie aussi aisement aux petites tumeurs, mais il y a du danger aux trop grandes, quant aux saisons de l'année? il ni faut pas mettre la main ni en autonne, ni en hiner , le printemps y est fort propres & l'entrée de lefté ni est pas manuaife, d'auantage le patient ne dost ni manger ni boire le iour precedent l'operation, & celan est pas encor assez, mais il faut aussi décharger le ventre, afin que plus aisément ce qui est sorty par le nombril , resourne dans le ventre en le pressant seulemet un peu auec les doiges & parce moyen la dilatation se glutine & se querits ou du moins si elle ne guerit, elle n'empire pas. C'est pourquoy au lieu de faire souffrir tant de douleurs aux pauures malades, on pourra appliquer dellus la partie ce Cerat con-Britist.

24. Boli armen. Sang. draconis maffich sareocoll. ana. 3; bylingue, seeul vuluer.ana 5iy, resna pini, 3; s. voli albumnis o Cera ana. Q. S. Mss. of star scratum. Traité Nouneau

hir fabir i: 1.
partie; il faut auoir vne bonne bande de
partie, de toile; & en embandet le ventre; en telle
peraleh, forte que venant vers le nombril elle fait vn
chap, 15- cercle comme vn galteau; ou comme yn

\*\*cercle comme vn galteau, ou comme vn coulliner vn peu dur, & au millieu de ce cercle, il faut mettre vn pertit peloron de linge bien ferré, lequel il faut pofer droit dell'us la dilatation du nombrit, afin d'empelcher que l'inceftio ou l'onnentieur, », ne retombent hors de leur lieu naturel.

SECONDE

# SECONDE PARTIE

OV

Traité des maux de la Vescie, & principalement de ceux qui demandent l'Operation de la main.

Des causes, signes, & prognostiques, de la suppression de l'orine,

#### CHAPITRE I.

Es Chiturgiens doiuent auoit vne par que l'es faite & exacte connoillance de si. Chimagnes, & des caustes de la spreyillon de l'es de l'est autre par ceux qui n'ont pas cette connoile que que l'es leur par ceux qui n'ont pas cette connoile que que que l'es leur faire commonstre quelque malade qui a vne diffi: miljance culté d'vriner, que la caute prouient de des signes quelque pietre ; Celt pourquoy vous les de la signe voyez d'abord courit aux remedes diureti- profisin de que, qui calent net tres d'augret, au calent de tres d'augret, que l'autren de l'entre profisin de que que que qu'allen de tres d'augret par celle l'entre profisin de l'entre profision de l'entre prof

82 Traité Nouveau dents, & le plus fouuent la mort.

Or les causes de la suppression de l'avine

de la lup- Les causes internes sont comme lors pressont qu'il croit quelque carnosité, au col de la de l'ori, qu'il croit quelque carnosité, au col de la ne. vescie ou au passage de l'orine, ou lors qu'il

y a quelque ventofité, inflammation , ou siteressis apoleme aux parties dediées à Peyine, ou internet aux parties circonuolínes, comme à l'internet aux parties circonuolínes, comme à l'internet aux parties circonuolínes, comme à l'internet aux parties circonuolínes, comme à l'aux pression de l'ori. Alammation, acrete inflammation tumefie se. & caufe de la doulent audit intellin, & parties acaute de la doulent audit intellin, & parties de l'aux propertion de l'appression de l'aux pressions de l'aux pres

Amb pa. E de la connexion que la vefeie à auce le 16. liu. 17. dit inteftin, le pus & le fable, peuuent auffi 6/10/19. boucher le paffàge de l'vrime , & par ce moyen caufer vne retention d'icelle , vue trop grande replexion , foit par la raifon commune à tous les vaiffœux remplis de

liqueurs, on soit que les fibres transversales de la veseis, soin trop deblités, par vne trop grande distenton, empeche que la saculte expultrice, ne peut faire ses sonctions naturelles, ce qui peut encor estre cause d'une suppression d'urin.

Les causes externes sont, comme pout des eaufes auoir appliqué trop long-temps desfus la etafue, region des reins, des remedes narcotiques, profina de ou pour auoir demeuré trop long-temps prime. dans de l'eau froide, ou bien pour auoir prime.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 8; mangé des viandes trop froides, pareillement vne luxation faite interieurement, aux vertebres des l'ombes , peut aussi estre caule d'une suppression d'urine, à cause de la compression que font les nerfs qui sortent de ces vertebres, lesquels font vne certaine stupeur qui affoiblit tellement la faculté expulsiue & le muscle qui tient la vescie serrée en telle sorte que la vescie, ne se peut pas déscharger.

Il faut auffi remarquer que l'orine est quelquesfois supprimée, sans qu'elle soit que l'oridans la vefcie, ce qui eft tres-dangereux, & eftre fupmenace le plus souuent de la mort; primée

Les causes pourquoy l'orine est quel sans quelquesfois supprimée hors de la vescie, sont le soit das

deux.

La premiere est, où a cause d'vne fieure continue & maligne, laquelle par sa chaleur contre nature attire l'orine dans le fes. pourcorps, & dans les veines, de forte que par la grande chaleur de cette fievre, elle brûle quelquesdans les vifgeres, & au fang. fous sup-

La seconde cause est; lors quelle est re- primee teniie au dessus des reins, à cause de l'obve (cie struction d'iceux, causées par des humeurs crasses. Où bien lors que quelque perite pierre s'est amassée en ces parties là, com-

me il arriue souuentefois.

Les signes pour connoiltre si la suppres-

La vescie,

#### 84 Traité Nonueau

8 pression de l'orine, est dans la vescie ou

des signes non; sont celles cy.

pour con. 11 ne faut que presser auec les mains maisse un misse un misse un misse un misse un misse un misse de l'Hypogesse, à l'endroit ou la sup- et lusce la voylee, e car si l'orine que de de l'orine quation comtre nature, rout de meline come de de l'orine quation comtre nature, tout de meline come de de me un come tumeur, get le malade sent de tres-

grandes douleurs.

Et si l'erine est dans le corps, & dans les veines, alors le sang deuient rout aqueux, les forces s'abbattent, & vous voyez que vostre malade meurt, le second ou le troi-sième jour.

vine chant retenite trop long-temps dans la vafeie, elle aquiert vine certaine qualité veneneuse, de lorte que la vesoir estant trop remplie d'vrine, vient à la fin à se defcharger en haut & se meste parmi route la masse du sang, a o'où elle est portée au certueau, à cause de la simpatine que les Mepiones ont autre la vessie.

## De la Curation de la suppression de l'urine.

## CHAP, II.

Ette Cure ne consiste qu'en l'évacuala vescie, ce qui se pourra faire auec des cette Guremedes qui purgent par les vrines, c'est à re. dire par des remedes difretiques.

Mais en l'application de ces remedes, il, faut vier de quelque precaution; car com grande me je vien de dire en parlant des causes, de la suppression de l'orine, si tost que l'on voit faut vn malade qui a vne difficulté d'oriner i uoir en ne se faut pas d'abord seruir des remedes diuretiques. remedes

Car si la cause de la suppression de l'oridiarctine, venoit de quelque Contulion, ou de quesquelque humeur acre, ou pour auoir fait quelque violent exercice, ou pour auoir pris quelque potion chaude, auquel il y cust des cantharides , ou bien s'il y a quel- brs qu'il que carnofité, ou aposteme au conduit de le faut l'vrine, alors il ne le faudra pas seruir des seruir des remedes difretiques. diforeti-

Mais on se pourra seruir des remedes ques. differiques, lors que l'on croit, qu'il y ait

demeuré au conduit de l'vrine quelque gherqu's petite pierre, ou du fable, o ut bien quelque fé dais fa-humeur gros & vilqueux, o ut pour s'eftre air des trop long temps baigné dans de l'eau froissements de, & choûcs femblables, differiti-

diùrei:- Il y a deux fortes de remedes diùreisques,

les premiers font de temperament chaud,

sempera- acre, fec, & fubtil, & ce font ceux qu'on

ments des appelle difretsques.

manu au appette ametriques.

madar

madar

diárnt
on s'en fert aux fievres, aux chaleurs des

reins, & du foye, fi ce n'elt qu'il y ait quel
que humeur corrompite, qui demande vne

prompte évacuation, en ce cas-là on fe

doit feuit des premiers.

"

Es vrais difretiques, sont les asperges,
Iag frence d'âche, la femence de chardon,
Ican PreVote no fa la vaeine des comcombres, la femence de cuMedecine min, la vacine d'enigium, de fenouil, la feès pau-mence de trie, les feinles de l'auvens, la manune les pau-mence d'enigies de l'auvens, la manune les pau-mence d'enigles de l'auvens, la manune les pauses, la fémence de nauer, le pejil,
les fauuage, la fémence de nauer, le pejil,
les fauuages, la femence de nauer, le pejil,

les raues, la racine de garance, les tendrons de ruse, l'oseille, le serpolet, &cc.

# Poudre tres-excellente pour provoquer l'urine.

Prenez de la racine d'ononis, deux dragmos, de la semence d'iris, & de la graine de l'aurier, de pluseurs Operations en Chieungie. 37 survers de chosun oue dragne, de la canelle une dema dragnes ingles le sout ensemble & en prenez le main & le soir une dragne, auec un peu de vin, & vous verrez le grand effeit de cette pondre.

On tient qu'vne raue estant coupée en deux, & la faisant bouillir auec des feuilles de persil, d'àche, & de poliot, & l'appliquer dessus la vescie, prouoque grandement l'u-

rine.

Pareillement vne demi dragme de bonne Theriaque dissoute en eau de raues, prouo que aussi grandement l'orine: on se pourra aussi seruir des bains, & demi bains.

# De l'Operation manuelle de la suppression de l'vrine.

# CHAP. III.

faut que cetre sonde soit ni trop grosse, ni

V Oici de la maniere que j'ay fait cette te poperation, je couche premierement il faut mon malade à la renuerte deffus vn bancfure etc. ou vne table, ou bien en fon propre licte, se aperadors il faut auoir vne fonde creule faite sian. d'argent ou d'estain, laquelle doit eltre bien polle, a fin de ne pas offenfer le lieu où on la veue introduire, premarquez qu'il

Traité Nouveas

trop mince, & à costé de cette sonde il y
doit auoir plusieurs petits trous & yn au
bout.

s quelle de, Rei per mers au cofté droit du malas quelle de, & tie prend la verge aucc la main gamanire, de, & aucc la main droite j'introduits ma inredui. Ionde dans le conduit de l'orine & lors vela fon que les fient qu'elle eft vers le col de la de dans upérés, ie la poulle rout outre, infques à ce la verge, qu'elle foit entrée dans la capacité de, la verge, en l'abbaillant va peu avec la ver-

Mais il faut prendre garde en introduiil faut fant la fonde de ne pasoffenflêr à l'entrée de quelque comme vne petite membrane qui fere pressucomme vne petite valvule, par le moyention en de laquelle, les trous des vailleaux spermal'introda-tiques viennent à se joindre ensemble. Vn Anatomisse nouneau nous a monstré

la fonde, que ce conduit est tortu, comme cette lettre. 62, ou bien vn double S. C'est pourquoy il faut donner deux tours à la londe, I'vn en la racine de la verge, en la haufant, contre le ventre, pour la faire descendre dans l'emressign, ou perinse, & l'autre au, bout dudit perinse, pres du fondement, pour remontre en la vessie; d'où vient que C'est dit, lors qu'on est parsenn au cel de la veste l'on acheue de pousser dans la vescie la londe, l'ayant abussilée aussi bien que la verges de plusieurs Operations en Chirurgie. 89

Or pour fçauoir finous donnons contre 4
cette petite membrane, c'eft que la fonde les figures
n'entre pas librement, & le malade fent de noiftes
tres grandes douleurs, joint qu'il fort du leyen
fang hors de la vetge.

denne co-

Lors que le remarque ces choses, le re-tre, cettes tire vn peu ma main en arriere, & puis le membra-repousse dereches, jusqu'a ce que ma sonde ne.

foit entrée dans la vescie.

Et lors quelle eft dans la vefeie Vwime 5 fort d'abord d'elle-mefme , par les petits sit élèces trous qu'il y a dans la fonde,ou bien li elle faire lers ne fort pas, ie prend vn petit bout de fil de jui evait ne fort pas, ie prend vn petit bout de ce fil l'arta-ne ne fort con d'argent, & can bout de ce fil l'arta-ne ne fort che vn petit morceau d'elponge , qui fert su élèce comme fie Cétoit vne petit feringue alors méllus ie poullé ce fil dans la fonde , & quand ie fuit se reni niglues au bout de la fonde, le la retire dehors comme fi ie voulois ferin-

retire dehors comme si le voulois seringuer, & l'orine sort comme quand on tire auce vnt seingue de l'eauhors de quelque vaisseaux.

Hir: Fabricius, d'Agiangendonte dit que « lors que l'orine est retenue dans la vescie bir fab

lors que l'orino est retenue dans la vecice bir fib a. parce qu'elle est trop pleine de sorte que la l'orin de returne de la vecice que la l'orin de returne perclute, à cause que la tunique de la vecice jajuns & ses sibres transversales par la distention é pa 58, ont esté rendués eneruées, & sans force pour poutoir comprimer & resterer, ce

qu'on voit foutent artiuer aux enfans qui demeurent trop fans vriner; en ce cas j'ay accoûrumé de bien chauffer l'enfanc detuant vn feu clair le penil, & puis oindre la partie aux ce d'inuite de apres chaud l'endroit de la velôte, y mettant chaudement par deflus des éfloupes peignées, car par ce moyen prefiguetous les entans malade out recounte la faculté d'vriner, c'étoti-là le fécret d'un cettain Ponitien, qui delluroit par ce moyen tous les enfans de la tapprellion de l'vrine de cette caule, lequel fecret le vous communique tres volontiers.

Ie ne parleray pas de l'introduction de la fonde, dans la veície des femmes, veu que l'entrée de la fonde, dans leux veície n'est point du tout mal-aisée;

# Suitte de ce discours, ou Traité de la Pierre.

De la cause des pierres.

CHAP. IV.

E ne veux pas icy parler sir l'histoire des pierres qui se penuent engendrer dans plusieurs

de plusieurs Operations en Chirurgie. 91 plufieurs parties de nostre corps, comme aux poulmons, à l'estomac, aux boyaux, que les au foye, & dans la bourfe du fiel, aux ro. pierres fe gnons, & dans la matrice, Monsieur Hou- ensen lier dit qu'vue femme, pissoit quatre mois dans te durant de la bouë, qui estoit quelquesfois tes messée auec du sang, cette pauure femme parties de sultent traitée, comme si les reins cussent estes corps. vicerés, parce que par internale elle sentoit de tres grades douleurs, cette pauure femme Houlies apres auoir long-temps langui mourut le sur le Coquatriéme mois, les Medecins qui l'anoyent mentaire traitée, souhaitoyent bien de sçauoir d'où phor. 75. procedoir que cette semme, auoit pissé par lin.4. vn si long espace de temps de la boue, meslée auec du sang, c'est pourquoy ils en firent l'ouuerture, mais ils ettoyent tous estonnés de voir que les reins & la vescie étoit en leur entier, car ils croy oyent de trouuer, quelque vlcere aux reins, ou en la vescie, mais ils trouuerent deux pierres en fon cœur & plusieurs apostemes, lesquels deux se purgeoyent par les vrines, & en passant pierres par les reins causoyent cette douleur dont me co · la panure femme estoit morte , i'ay bien d'une voulu reciter cette histoire, pour monstrer femme. qu'il n'y a point de parties en nostre corps, foit noble ou ignoble , qui ne soit sujette à engendrer des choses contre nature.

Mais retournous à nostre propos, &

92 Traité Nouveau voyons qu'elle peut estre la cause des pier-

Les pierres qui s'engendrent en la vescie, prennent le plus souuent leur origine des reins, d'où elles descendent dans la

velcie, par des petits vaisseaux que les Anatomistes appellent Vreteres;

de la caule des pierres sont deux, assauoir se des materielles, & efficientes.

La cause materielle sont des grosses hu-

meurs, vilqueules & terreftres.

La cause efficiente selon Galien, est vne excessive chaleur, la disposition naturelle y sert aussi, mais les excess de mauuais regime, en sont les principales causes les pietres sont engendrées en sostre corps, comme les utilles au four fuiuant Guidon; car la chaleur desseche le terrestre, & resont le subril;

Or depuis qu'elles font commençées elles croillent roujours par l'affluence de la mariere phlegmarique, & fablonneulesqui est vuie par cimentation, e'est vue maladie in numero, & se peu quelquessois dire caufe d'obstruction, lors qu'elle bouche le

des Spa-passage de l'vrine.

geriques Les Hermetiques ou Spageriques, eftisouchant ment que la pierre est engendrée, de la de 62 de substance sarrarée de l'vrine, laquelle se des pier coagule par le moyen de son propre sel,

comm

de pluseurs Operations en Chivurgie. 93 comme l'on peut voir dans vn pot de chambre, ou l'vrine a esté quelques jours.

Les petits enfans font fort fujects à la que les pierresparce que leusspatties font fort mole patit ea les , ce qui fait quelle s'elargillent faite faus fout ment lors que les excrements pallent part fors pair tobulte, laquelle iette le plus loing qu'elle da pierre, peut les excrements groffiers, letquels s'amaflers plusoit aux enfans qu'a ceux qui font plus advancé en aage, cat ils font plus gournands, & ils vietnt d'exercice d'abord qu'ils ont maneé.

# Des signes des pierres.

#### CHAP. V.

Omme la connoissance de l'obstrui que se sécon est resencessaire au Chicurgien, auns la connoissance des signes pour toa unis la connoissance des signes pour toa unis la pierre est aux reins, out en la velcie, sen spitt me sonn passons necessaires, de consider liste la vables, car ayant une parfaite connoissance liste la vables, car ayant vne parfaite connoissance liste de liste une est la pierre, on ne manquera ia-necessaire ai de venir au bout de la cure;

Or les fignes pour fauoir si la pierre est Chirurdans la vescie sont dix.

Le premier est que l'yrine du malade est

aqueule, & au fonds fablonneule, & queli questois on remarque au fonds de l'vrine, vne certaine matiere gluante qui a vne tres mauuaise odeur & salée, c'est pourquoy les malades vrinants, fentent vne cuison tres ardente qui les oblige à croizer les jambes; Le fesond est que les malades, sont souuent contraint d'vriner iour & nuich;

Le troisième est que l'yrine s'arreste quelquefois tout d'vn coup, ce qui arriue lors que la pierre se met droit deuant le conduit de l'vrine.

Le quatriéme est lors que le malade a pisse, l'envie de pisser ne cesse pas, mais à tous moments il veut recommencera

Le cinquiéme est que les malades, sentent vne grande demangeailon à la teste de la verge, c'est pourquoy ils sont contraints, d'y porter la main pour la frotter.

Le sixième est que la verge leur dresse à tous moments lans aucun lujet n'y occafion, & d'abord s'abaiffe.

Le septiéme est que le malade sent vne pesanteur au perinée , principalement en descendant les degrez.

Le huitième est que les veines bemorrordales s'enflent & le fondement sort, à cause de la conpression que fait la pierre.

Le neuvième, est que lors qu'il y a plusieurs pierres, on entend a mesure que le.

malade

de plusieurs Operations en Chirurgie. 95 malade fait quelque mouuement, vn cettain craquement que font les pierres, les vnes contre les autres.

Le dixiéme est qu'en poussant vne sonde dans la vestie , vous sentés qu'elle donne courre quelque chos de deur , & raboureux, car la sonde ne trompe iamais le Medecin comme patle Celfe. Car il artiue soutenterois que la pierre est enfermée dans vn petit cyste, ou quelle est countere de quelque humeur gluante ou visquesse, ou bien qu'elle est countere d'vne petite membrane, ce que vous s'çaurez par la tou-chement de la sonde.

Diuers remedes pour rompre, & pour faire sorsir la pierre.

# CHAP. VI.

Panez vne bonne quantité d'escocces de choux, & autant de l'herbe furnommée argentine. & vne douzaine de bons citrons, faites le tour distiler dans vn alambic a feu de sable, & en tirés tant d'eau que vous pource, puis aliste là repole recte eau, & au bout de neufs iours, il en faudra prendre chaque marin deux doigts, & apres l'auoi pris, il le fau promener vne

Traité Nouncau heure ou deux, & apres prendre vn bouillon.

Remarquez qu'auant que de distiler les

escorses de choux, il les faut laisser tremper 24, heures dans de l'eau.

# Autre remede pour rompre la pierre.

Prenez racines d'ourties, & de raues ou raiforts, & les faites dittiler dans vn alembic a feu de sable, ou de cendres, & prenez tous les matins de cette eau, auec vn peu de vin & de sucre, & pour preque que cette eau est tres bonne, vous n'auez qu'a mettre vne pierre dans ladite eau, & vous verrez qu'elle se rompra & brisera en fort peu de temps.

# Autre remede pour rompre la pierres

Prenez 16. j. de la racine de l'herbe qu'on appelle dent de chien, & la nettoyez & lecouez-la bien doucement sans la frotter ni en oster les petits filaments qui y tienment n'y mesme les lauer, pillés cette racine dans vn mortier de marbre, ou autre pierre bien dure, y adioutant pour le mieux piller vn peu de vin blane, estant pillée il la faut mettre tremper dans trois liures de vin blanc qui ne soit pas trop vieux, dans

de plusseux Operationi en Chirargie, 197
une phiole de vetre bien bouchée, de forte que celane se puille évanter durant trois
iours a l'ombre, & en vn lieu ou le sole-il ne
donne point, puis il en faut prendre trois
onces trois matins de suitre, jusques a ce
que le tout soit consumé saus other lestites racines hors du vin, mais remarquez
qu'auant que de vous en seruir, c'est a ditev ni out ou deux denant, il faudeta prendev vroprité de pillules de Therebernham.

Autre pour le mesme.

Prenez vne pinte d'eau de fontaine, adioustez-y deux onces de miel, & les faites bouillir, & escumez-les, & lors qu'il n'y aura plus d'escume, meslez-y deux onces de pois chiches & trois racines de chicorée sauuage, trois de fenouil, trois de perfil, trois de guimauues : & si les racines sont trop groffes, il n'en faudra prendre que deux de chicune, puis quand le tout sera demi bouilli, il y faut adiouter, deux onces des quatres femences froides grandes concassées auec vn citron coupé en trois puis quand le tout sera reduit en trois cuisons, il le faut passer par vnlinge blanc, & en pren. dre tous les matins vn petit demi verre, deux heures auant que de desieuner ou diner, & autant deux heures auant le souper, & continuez iusques a ce que vous n'en ayez plus.

# Rémede pour faire rompre la pierre & pour la faire sortir.

Prenez vu fagot de farmens de vigne verd, & vn fagot d'eléotre de februes, faires brulet ces deux fagots en vue place bien nette, & pallez bien la cendre qui en viendra & en prenez le pois d'iva letu, & la mettez tremper dans deux verres de vin blanc l'efpace de 44. heures & continuez a en prendre neufs iours durant, & fi par auanture l'efformach vous fair mal, il fau-dra vier de tablettes de diarrhodan, & il faut que le tout fe faife a ieun, & ne manger que trois heutes apres

## De la maniere d'extraire les petites pierres du conduit de l'vrine.

# CHAPITRE VII

L'arriue quelquesfois qu'ily a quelques peures partes dans la velcie, letquelles Pourquey lont quelquesfois iettées par l'impetuofité la paites de l'artine au conduit de la verge, d'où de prince les ne peunent pas fortir qu'elle dilatapar, an, tion que l'on procure auce des fomentatent an, tion que l'on procure auce des fomentaestadait itons, & par l'application des remedes rede l'uri-molitifs, & qu'elles font fidures qu'on ne de plusieurs Operations en Chirurgie. 99 les peut pas briler auec la tarriere, & autres instruments dediés à cet effect, de forte que l'on se voit bien sounent contraint d'en venir a l'operation ; Or pour De la fifaire cette operation auec ordre, il faut tuation que le malade foit couché dessus vn banc du malaou vne table, ou bien dans son propre lick. de.

Puis il faut tirer en haut le prepuce tant que le malade le pourra soushir, & le lier vers le bout du gland, afin que l'opperation De quelle estant faite, & le prepuce estant delici faut faire rerourne dans son melme lieu, & par ce cette operation de la company de la co

moyen couure l'incision.

Mais auant que de faire l'incision il faut encor lier la verge droit dessous la pierre afin d'empecher quelle ne retombe dans la velcie.

Vos deux ligatures estant faites, il faut prendre la verge auec la main gauche, & la plier vn peu en forme de demi cercle.

Puis il faut faire vne petite incision a costé de la verge, & selon la rectitude des fibres, Caril ne faut pas faire l'incision en Le lieu ou la partie superieure de peur d'offencer cette il faut grande veine & artere qu'on remarque en faire l'incette partie, car ces vaisséaux estants offen- cifion, fés causeroyent vne tres grande hemorrhagie qui donncroit bien de la peine a l'Operateur.

loint que comme la partie inferieure de

Traité Nonneau

3. la verge eft fort nettreule elle ne poursoit parquer du moins que de caufer de tres grande il ne faut du moins que de caufer de tres grande il ne faut fait evoltre incifion a cofté de la verge, male par de ayant apperceu la pierre, il la faut tire vie info dehors auce vu petit croches, ou le bec de rister de Corbin, Et l'ayant tirée hots du Canal de la verge, la verge, il faudra appliquer deffusi la playe

le suiuant medicament glutinatif.

By. Terebenth. Z in.

Gomme élemmi. Z j.

Du fang de dragon.

Et du mastich ana. Z j.

Et autour de la verge il l'aut mettre vn repercussif faice auce vn blanc d'œuf, & de la poudre de bol d'Armenie de la poudre d'aloës, vn peu de farine volatile & vn peu d'huile rosat.

Il ne fera pas mauuais de mettre dans le conduit de la verge vne petite chandelle de cire ou de plomb, oinéte auev nn peu de therebenthine de Venife, afin d'aider la nature, à agglutine la playe, & pour empecher qu'il ne croiffe quelque chais fuperflue, qui a la fin pourroit cauler quelque camonité.

# La maniere d'extraire la pierre aux petits Enfans.

#### CHAP. VIII.

Pour faire cette operation auec methode il faut que le malade foit premierement vn peu purgé & faigné fi la ne-

cessité le requiert.

Puis deux ou trois jours apres lors que vous voudres faire cette operation ( Car quand inne faut pas faire l'operation le beau len-gle agit de corps en eft encor eftmeu) il faudra fais-ent et corps en eft encor eftmeu) il faudra fais-ent epere lauter le malade, 3 ou 4, fois, & le fe-ration coufer par les efpaules afin démouvoir la pierte, & pour la faire descendre au fonds de la vécife.

L'Enfant estant ainsi situé, il faut graisses

Traite Nouneau.

introdu. Hion des doigts dans la fondsment.

exivactio

de la

vn-doigt ou deux de la main gauche auce vn peu d'huile, & les pouffer dans le fondement le plus qu'il sera possible, afin de tacher d'amener la pierre au col de la velcie, & auec la main droite il faut faire quelque legere compression dessus l'aine, afin de faire descendre la pierre du fonds de la vescie par dessus l'es pubis vers le col d'icelle, la pierre estant au col de la vescie, il la faur tenir sujecte, de peur quelle neretombe au fond de la dite vescie.

Puis il faut faire vne incision a costé de la ligne du perine enuiron deux ou trois doigts prés du fondement, en prenant bien il faut fairel'in-garde de ne pas inciler l'intestin rectum, cision, & Car en tirant la plerre au col de la vescie, du lieu oul'intestin se redouble founenresfois , de soril la faut te que si ce boyau estoit incisé, la matiere faire.

fecale fortiroit par le Canal de l'viine , &c l'vrine sorriroit par le fondement, ou bien tous deux par les mesmes conduits. C'estpourquoy il faur bien prendre gardeà cela, car la playe ne se pourroir pas con-solider.

L'incision estant faite & ayant apperceu la pierre il la faut tirer dehorsauec des crochees, tels qu'on les voit figures dans Amb. Paré. Apres auoir arraché la pierre il faupierre ve-dra trairrer la playe comme nous ditons ci

yel Amb. apres, toutesfois il ne sera pas matuais de mettre dans la playe vne tente canulées de plasseurs Operations en Chirurgie. 103 afin que le sang qui sott d'icelle, tombé dans la vescie, d'où il pourra facilement estre jetté dehors auec l'uripe.

# De la maniere d'extraire la pierre aux hommes par le haut & grand Appareil.

CHAP. IX.

A Pres auoir donné la methode d'exfraire la pierre hors du canal de l'vrine, & de celle de la vescie des enfans, Il faut que le donne maintenant la methode d'extraire la pierre aux hommes par le haut ou grand appareil, Mais il faut premierement sçauoir que cette operation est appellée le grand appareil; a cause du grand pourquoy nombre de bandages, & instruments, dont cette opeon se ser pour faire cette operation, comme des sondes choses & ounertes, des ra-le grand foirs à deux tranchants , des Conducteurs, ou baut des becs de Canne, & des becs de Corbins, appareil. · des dilatoires, des tenailles en forme de becs de canne, des aillerons, & des Curettes, des crochets & des cannules, &c

G

outre tout cet équipage, il faut encor quatre hommes pour tenir le malade dans sue affictte inesprantable. cette ope-

vation.

Ayant tous ces instruments prets, il faut qu'est-ce si la necessité le requiert, que le malade qu'il faut foit vn peu purgé & laigné, puis deux ou trois jours apres il faut venir a l'operation, auat que mais pas le lendemain de la medecine, parde faire ce que tous le Corps en est encor esmeu. De sorte qu'au bout de deux ou trois jours, il faut situer le malade dessus vn banc

ou vne table en telle forte qu'il foit a quelle si- demi renversé, & luy mettre dessous ses reins yn coiffin , & deflous fes felles yn malade pour bien faire cetze operazion.

drap plié en plusieurs doubles, les mains attachées dessus ses genouils, & les pieds contre ses fesses. Estant ainsi situé il faut passer vne bonne bande deux ou trois fois selon que vous le jugerez a propos derriere son col, & la repasser par les pieds tout de mesme que vous le voyez , figuré dans Amb. Paré, & dans Franciscus Arcens. Ce grand Operateur: Puis il faut comme ay dit, auoir quatre hommes deux desquels seront pour luy tenir les bras, & les deux autres pour luy tenir les pieds, afin que le malade ne puisse remuer ses pieds n'y rechauser ses fesses, mais qu'il demeure stable & immobile, afin de pouvoir mieux

faire l'operation. Le malade estant ainsi situé il faut que celuy qui doit faire l'operation, pouffe vne l'Operatsur. fonde ouverte dans le conduit de l'vrine,

de plusieurs Operations en Chirurgie. 105 jul ju'a ce qu'il soir venu dans la vescie.

La sonde estant dans la vescie, il faut tout doucement tirer a foy, le fil ou la verge d'argent, qui est dans cette londe qu'el-ce afin de donner illuë a l'vrine qui pourroit faire pour estre en la vescie , puis il faur qu'vn terni-donner teur rire en haur le Scrotum, & les testicules passage & vers le costé droit , afin de pouuoir mieux l'orine. voir le creux de la fonde, qui se verra alors facilement au costé gauche.

Ayant remarqué le creux de la fonde an costé gauche, il faut faire vostre incision dessus le creux de certe sonde, enuiron deux ou trois doigts prés du fondement, & de la longueur que vous ingerez

a propos.

Car en faisant l'incisson trop pres du fon-du lieu ou dement, on courroit danger en tirant la il faut pierre, de rompre quelque rameaux des faire l'inveines hemorroydales, ce qui seroit d'abord cissonsuiui d'vne furicuse hemorrhagie qui donneroit bien la peine a l'Operateur pour l'arrefter, d'où vient que plusieurs en ont perdu la vie, & com ne le muscle sphinter se · trouue fort proche de ces parties, on le pourroit trop dilater, & le corps de la

velcie Donc afin d'énirer ces accidents, on le pourquoy trouue fort bien de faire l'incision au costé il faut gauche, car en faisant l'incision au costé cison au costé sau-droit, comme font aucuns, on ne peut che de du moins que d'inciser les apeuneroses de mon auce. sté droit, la tigne du perinée, lesquels estant coupés la playe ne se pourroit pas reunir qu'à

la playe ne se pourroit pas reunir qu'à grand peines parce que la ligne du perinés, est fort celle de exangie; o joint que comme l'vrine passe par cette ligne, elle empecheroit par son acrimonte, la consolidation de la playe, es sort qu'il y rette tousiours vne petite fishule par ou l'vrine fitte continuellement; qui est vne tres-grande incommodité.

de quelle doit eltre plus large par dehors que s'andeur par dehors que s'andeur par dedans, parce qu'elle s'elargit affes il faut lors qu'ony met le bec de canne de le distirei in. latoiresta raison est qu'vne playe faire auec

le tranchant d'un coureau, încle genetir pas fi cot qu'une qui fera detchirée, Car la la raina playe qui fe fair ance le couteau, coupe pour quis transverfalement les fibres , ce qui emme playe poche quelle ne le peut pas fi roit gueris qui fe fair au lieu qu'une playe qu'on déchire le fair aute zun felon la reclitude des fibres , c'ett pourcesseau quoy l'incifion qu'on fair deflius la fonde rit par fine doit eltre que de la largeur d'un pout efigure, ou cuntion a fain de la poutoir un pet di-

megdife later, lors que le conducteur & le diladechires toiryentre. Puis il faut auoir yn conducteur qui de plusteurs Operations en Chirurgie. 107
vers la pointe air vue petite tette en rond
roomme les fimples fondes desfquelles on se la manieser pour sonder les playes, & poulfer cerativité conducteur dans l'incision, en telle forte résolaireque s'a teste entre dans la sonde creute, sur éte e endielaquelle vous auez faite vostre incision. La vosée,
afin de seruit de guide aux aurres s'intruments qu'on veut introduire dans la vetcie pour chaçcher la pierre.

Ce conducteur estant introduit dans la playe, il y saut embor introduite vn autre, qui vers sa pointe ait vne petite Causté &c la pousser a dessus, c'est à dire qu'il saut qu'elle passe la pointe du premier Gondu-

éteur.

Cela fair, il faut tirer hors de la playe la fonde creuse sur faire vostre incisson, de pousse le deux Conducteurs dans le corps de la vessie, & en les passant il les faut tourner deçà & delà afin de pounoit tronuer la pierre.

Les conducteurs estants dans la vescie.

il faut que celiry qui fait l'operation, les fetre vn peut entre les doigns, & pouffer entre ces deux Condudeurs, le bec de cane, lequel ettant entré dans la veticie il la faudra vn peut toutner du coffé gauche, & ur puis l'ouarit afin de dilater & agrandir la comissi playe, i infeques a ce quelle foit affer genade il flate il pour donner libre entrée aux aiures infitte playe.

ments, desquels il se faut encor servir. Il atriue souuentesois que par le seul bec de cane la pierre est tirée hors de la vescie.

Mais il atriue aufli quelquesfois que la pierre et fi grande quelle ne peu pas pafér par la playe, si cela arriue il faut tire hors de la playe le bec de cane, & y introduire le dilatoire, lequel eflant entré dans la veſcie, il faudra ſerrer ſes deux bouts enſemble, & parce moyen la playe le fera figrande qu'on voudra.

La playe estant assez grande pour donner libre sortie a la pierre, il faudra reprendre le bec de cane, droit ou courbe,

pour chercher la pierre.

Ayant trouné la pierte il la faut empoigner auec ledit bec de cane, & lier viftequ'eft-ce ment les branches dudit bec de cane, pour qu'il faut empecher que la pierre ne retombe : plufaire lors sieurs Operateurs pour empecher que la qu'on a pierre ne retombe hors da bec de cane, trouué la mettent doux doigts dans le fondement, & pierre. tachent de gagner le dessus de la pierre, & font quelque legere compression dessus l'Epigastre, les autres se seruent des aillerous & mettent a costé des tenailles, c'est à dire l'vne dessus & l'autre dessous, & empoignent le bec de cane ou la pierre est dedans, de sorte que la pierre ne peut aucunement eschapper, mais en recompense

de plusieurs Operations en Chirurgie. 109 les malades sentent bien plus de douleur, c'est pourquoy s'il est possible de s'en pasfer, il ne s'en faudra pas seruir.

Il faut encor icy remarquer vne chose qui est, que lors qu'on a ainsi la pierre, il ne comment la faut pas tirer tout d'vn coup, mais il la ilfaut tifaut tirer peu a peu, & la tourner de costé rer la & d'autre, & la tirer auec la plus grande pierres dexterité qui sera possible, & en la tirant il ne faut pas trop serrer les tenailles, de peur quelle ne se rompe en petite pieces: ayant tiré la pierre, il faut derechef resonder auec vn des conducteurs, pour sçauoir s'il y a encor quelque autre pierre dans la vescie, & s'il se trouuoit qu'il y en cust encor quelque autre, ou du fáble ou du fang coagulé dans la velcie, il le fandra feruir d'vn instrument que les Operateurs appellent curettes, & les tirer auec lesdits instruments, ou bien auec le bec de cane.

Et fila pierre est trop grosse, il la faudra rompre auec le bec de Corbin dentelé, & tirer tous les fragments ou sable auec les curertes.

es curettes.

Methode tres-assurée pour extraire la pierre, sans aucun danger, & sans faire Souffrir beaucoup de douleurs, aux malades.

#### CHAP. X.

Ous remarquez bien qu'entre toutes les manieres d'extraire la pierre, il n'y en a pas vne qui foit si cruelle, ni si dangereule que celle dont nous auons parlé au chap, precedent, car confiderez le grand nombre d'instruments, desquels ils se faut fertir, vous m'advouerez que le seul regard, doit faire fremir & époquanter les paquires malades, faites reflection fur la dilatation qu'il faut faire aucc les dilatoires & les conducteurs, pour donner passage au reste de cet équipage, & vous m'advoilerez, que ce n'est pas sans raison qu'Happocrate en fon ferment jure de ne couper jamais ceux qui ont la pierre, surquoy faisant reflection, Celfe & Paul Egineta ont dit de n'en faire jamais leissay, n'y en tout temps, n'y en tout aage, n'y en toute disposition de cette maladie, mais seulement au prin-

Hipp, en fon ferment jure dene couper in mais la pierre.

Cellelin, chap. 10.

ans, & qui n'en ait pas plus de quatorze, 85

temps & dans vn corps qui ait pallé neuf

de plusieurs Operations en Chirurgie. Les lors que le mal est fi grand qu'on ne le peut pas ofter par des medicaments, se qu'il temble que le malade ne peut euiter la mort, alors il nous elt permis de suitue ectre belle fentence.

Il vaut mieux essayer, un remede incertain. Que ne vouloir presser au malade la main.

C'est ce qui m'oblige a vous donner maintenant la Methode d'extraire la pierre, fans aucun danger & fans faire loufrir beaucoup de douleur a ceux qui se mettont entre vos mains, comme vous de poutrez voir par la fuitte de ce discours.

Il faut donc premierement (afin de bien qu'of-ce, faire cette operation) que le malade foit vii qu'il faire peu purgé & faigné fila necessité le requiert, faire aser le fituer comme le vien de dire au chapetit de la comme de vien de dire de vien de dire de vien de direction de vien de vien de direction de vien de vie

pitre precedent.

Puis il faut mettre dans le Canal de la verge vne canule, on fonde creuse afin de comment

donner paffage a l'vrine.

Alors il faut tout doucement retiret cetții furit, te ionde en telle fotte que le bout de ladine honde telle petit boutno untelle) par l'amplie.
roiffe a l'extremité du mufele fibineter.
Cela fait il faut qu'un feruiteur elleue en
haut le seroutne & les rejficults du cofié
haut le seroutne & les rejficults du cofié.

Traité Nouneau

droit: comme j'ay desia dit, & marquer auec de l'encre au costé gauche, le lieu ou l'on veut faire l'incision dessus la sonde.

Puis auec vne bonne lancette bien forte, ou auec vn biftori droit, il faut faire

maniere il fant faire cette incision.

vostre incision droit dessus la marque que vous aurez faite auec de l'encre, en gardant toufiours la rectitude des fibres, & incifer jusques ace que vous soyez au bout de la tonde, & puis pousser ladite sonde, dans le corps de la vescie, afin de sçavoir

de quel costé est la pierre.

Vostre sonde vous ayant donné des signes & des marques affeurées du lieu eftla pierre, il faut tacher s'il est possible de la tirer dehors, ce qui se pourra facilement faire auec le seul bec de Cane, sans se seruir de tous ces instruments, dont j'ay parlé au chapitre precedent.

Mais si vous remarquez qu'il y a quelque peine à auoir la pierre, & que pour l'auoir il faudroit faire souffrir de la doupour ex-leur au malade; je vous conseille d'auoir

traire la vn peu de patience pour quelques jours, & appliquer en attendant dessus la partie, va emplastre adstringent, jusques à ce que le malade, ait vn peu repris ses forces & qu'il

foit fans fievre.

Puis au bout de quatre ou cinq jours il faudra ofter l'appareil, & tacher de

pièrre.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 113 tirer la pierre ; & par ainsi le malade ne fouffrira pas la moitié tant de douleur comme autrement, joint que l'on a souuentefois veu que la pierre se presen-qu'est-ce te d'elle meime deuant la trou, est si par ha-faire si la zard elle nese presentoit pas, deuant la pla-pierre ne ye, il faudra ayder a la faire descendre en se presenmettant deux doigts dans le fondement & te parvers comprimer vn peu le petir ventre.

Et ayant amené la pierre au col de la vescie, il la faudra tirer auec le bec de Cane, comme j'ay desia dit, ou auec vn pe-

tit crochet.

Et si la pierre estoit trop grosse, & quelle ne peufle pas paffer par le col de la vefcie, il la faudra rompre auec le bec de Corbin dentelé, ou aucc des tenailles incifiues, car il vaut mieux le rompre que de faire souffrir le malade pour l'avoir.

Autre maniere d'extraire la pierre sans faire aucune incision.

CHAP. XI.

PRosper Alpinus docte medecin de no- Prosper stre temps, propose vne nouuelle opi- Alpinus

n4 Traité Nouneau

en son s. nion, touchant l'extraction de la pierre liure de hors de la vescie, & en donne la methomedicina de, comment les medecins de l'Egypte, exprisles rivent sans faire aucune incision.

Il dit donc que les medecins de ce pays là ont plusieurs canules en forme de seringues, les vnes plus grosses que les autres, & de la longueur de huit a neuf doigts.

Puis il faut prendre la plus petife de ces canules, & l'introduire dans le Canal de la verge, & fouffler vn peu dans cette canule, afin de dilater cette partie, & prefler vn peu vers la verge, & vers le periné.

Le passage estant bien dilaée, il faur pousser les autres canules jusques a l'entre de la vescie, puis il faur mettre deux doigus dans le fondement, afin de tacher d'approcher la pietre, vers le col de la vescie, et faire en sorte quelle entre dans la Caanule s'il est possible, la pietre estant proche de la canule, il faur que VOperateur active son souffle par les canules, de sorte qu'en attitant le vent a soy, ils attirent en mesme temps la pietre.

Cet Autheur pour confirmation de cette notwelle opinion en propofe les experiences qu'il en a veues, & la raifon auffi, caril dit que la dilatation de la marifec eft bien plus eftrange en l'accouchement, que non pas celle qu'on procure au

de plusieurs Operations en Chirurgie. 115 conduit de la verge qui est membrancuse.

Cependant je fouhaitterois d'en avoit veu quelque experience, & par des Maffresexperts, pour vous l'affiner auce plus de verité, car j'estime, cette operation, plus belle a representer par le discours, qu'à renit par les essections.

## De la maniere d'extraire la pierre aux femmes.

#### CHAP, XIL

L est affez facile a connoistre files fem-I mes ont vne ou plusieurs pierres, ou si elles n'en ont point, car outre les fignes dont j'ay parlé ci dessus au chap. 5. on n'a qu'à mettre vn ou deux doigts dans le col de la matrice, où d'abord on tronue la velcie, mais comme i'ay dit cy-dessus il n'y a rien de si certain, n'y si assuré, que la sonde pour nous donner vne vraye, & exacte connoissance de quelque corps eftranger dans la vescie: le doigt est bon lors qu'il y a quelque petite pierre au conduit de l'vrine, mais certes pour bien scauoir, s'il y a quelque pierre au fonds de la vescie, il faut auoir vne sonde, car c'est elle comme dit Celse qui ne trompe jamais le medecin,

Traite Nonnean

joint que l'entrée des fondes en la vescie des femmes n'est pas si mal aisée que celle fieurs fe. des hommes, parce que les femmes ont le mes (e col de la vescie plus droit , plus large , & font elles beaucoup plus court. D'où vient que plumelmes tirées des sieurs femmes se sont elles mesmes tirées Dierres

des petites pierres aucc leurs doigts hors bors du du col de la vescie. col de la Cependant il faut ici rémarquer que les vescie.

filles ne peutent pas fouffrir l'introduction aue les de la fonde au col de leur matrice, sans foufpetites filfrir de tres-grandes douleurs, mais celles qui sont aagées de six ou sept ans, le peu-

uent souffrir : C'est pourquoy lors que l'on veut tirer la pierre à vne petite fille, il y l'introdu-Hion de faut proceder tout de melme comme aux la fonde garçons. dans le Mais si les filles peuuent soustrir l'introcol de la

duction des doigts dans le col de leur mamatrice trice, l'Operation se fait plus facilement, car l' Amariest situé entre la vescie & le boyan Cullier.

> De sorte que pour faire cette Operation, il faut mettre dans le col de la vescie vne sonde droite, qui soit vn peu creule

il faut faire l'invers sa pointe, & faire vne petite incision fur le creux de cette fonde, c'est a dire au costé de la vescie ou se vient rendre le col de la matrice.

L'incision estant faire, il faut pousser

comment

cifion.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 17
par la playe vn petit crochet dans la velet,
ce tachet d'artiter ainfi la pierre, ou au lieu
d'vn crochet on le pourra fecuir d'vne tela pierre, en mertant deux doigse dans le it faus
fondement. Et fi la pierre eft trop grande estraire
il la faudra rompre en plusieurs pieces, la pierre,
auce le bec du Corbin dentelé, de tiret
cous les morceaux, car fi la pierre efhoit
trop groffie elle feroit trop d'opprefilon,
au muicles, de par ce moyen empecheroit
que l'vrine ne pourroit pas fortir que vo-

De la Curation des playes apres l'extraction des prieres, & de la situation du malade dans son liet.

### CHAP. XIII.

Iontairement.

A Pres l'extraction de la pierre ; il faudra fi la playe ch' trop grande , faire 1 quelques points d'aiguille aucc de la foye commone cramoille forte & circe , & n'elparguer d' la paffer vn peu auant dans les bords de playe ala paffer vn peu auant dans les bords de playe ala playe depeur qu'elle ne dechire la chair, pres 1 ves.

Requarquez, qu'il faut laisser vn petit tradion espace, pour mettre dans la playe ync

118 Traite Nouneau tente canulée, pour donner passage aux

choses estranges.

Mais il ne se faut pas long-temps seruir de cette canule de peur que la nature ne s'accoustume à jetter toussours l'vrine par la playe, ce qui pourroit cauler vne fiftule.

réliu.17. dr 46.

Il sera aussi necessaire pour empecher Amb.Ps- l'inflammation, d'appliquer autour de la chap. 45. partic vn medicament repercussif, fait auec vn blanc d'œuf, du bold'Armenic, du fang de Dragon & vnpeu d'huile rofat.

Il faut auffi prendre garde, fi le Scrotum ne deuient liuide, car apres l'extraction de la pierre, il descend quelquefois du sang, en assez grande quantité, dans ledit Serotum, & que fi on n'y met d'abord dure-

mede elle tourne engangrene.

il faut (1. quer le malade . en son list.

Apres cela il faut mettre le malade dans fon lict, & metire dessus luy vn petit sac plein de fon, afin que l'vrine & les autres excrements s'y embibent, & il en faut auoir plusieurs, afin de les rechanger de temps en temps, & il faut que le malade tienne les jambes croisées, ou ses genouil liés ensemble, & quelques jours après on pourra faire quelques injections dans la playe par la verge, afin de moderer l'intemperance qui pourroit estre dans la vescie, on pourra faire cette in-

iniection par la ce de la

rescie.

icction

de plusieurs Operations en Chirurgie.

10 jection aucc vn peu d'eau de Plamin, de Morelle de Rofe, de aucc vn peu d'inule rosat, de lors qu'on s'en voudra sensir, il faut qu'elle soit vn peu tiede, de traiter la playe comme vue simple solution de continuité.



# TROISIEME PARTIE

01

# Traité de la CATARACTE

Dunom & de la definition de la CATARACTE

## CHAPITRE I.

L n'y a point de parties en nostre conpa qui loyent sujettes a tant de maladies & que les d'accidents comme les yeux s'oit a raison yeux s'our des humeurs, des tuniques, & des nerss plustes equi les composent foit à caus de sem sufcles, plustes des proposents des parties qui leur frest de, s'eucuet.

Or entre les maladies qui affligent les yeux, la Cataratle est vne des maladies, que les Operateurs de ce temps se sont reservés, auec les Hermies & les Pierres.

La Cataratte est appellée par les Grees,

Hypo-

de plusieurs Operations en Chirurgie. 121 Hypochyma, & par les Arabes Ean, & par les Latins Suffufio, le vulgaire l'appelle auffi des diner-(ataratte, ou Maslle, prenant ce nom des lasions de portes ou coulifes, qui aux villes & cha- 12 carafteaux tombent du haut en bas , & empe-vatte. chent le passage a ceux qui veulent entrer, de mesme la Cataralte, tombant d'enhant asçauoir de la teste sur les yeux bouche le Hier Fab. passage à la lumiere, & a la veuë, c'est pëdente 2. pourquoy Auicenne à tres-bien dit, que pare des oquia Catarilat. id est sigillat , vel obturat perat.chi-Foramen veuz, c'est à dire (fi ie traduit bien) rur. ch.16 parce qu'il bouche le trou de la prunelle d'où vient que les malades deuiennent aveugles: Or à proprement parler la Catara-qu'eff-ce Ele n'est autre choie, qu'vne talche, ou ma- que catacule dans la prunelle de l'œil , qui empe. ratte. che la veuë: ou vne taye ou petite peau qui naist sous la tunique cornée, a l'endroit

Ou bien on peut dire que la Cataralle est vn assemblage d'humeurs superflués qui s'espassifit, comme vne petire peastentre la tunique s'ornée, & l'humeur erssalle autre de-ne, à l'endroit de la prunelle de l'est, laquelle soition de empelche que le premier organe de la veite la cata-s'fait en forme de Cryssall ne peut distin. In dement receuoir les cipeces des choles externes, & qui ne les peut librement dister-

de la pupille ou prunelle de l'œil.

ner.

## Dulieu ou la Cararacte s'engendre & s'arreste.

#### CHAP. II.

Te trouve que les Autheurs ne sont pas d'accord touchant le vray lieu de l'œil, ou se concrée la Cataratte, car Celle, dit Celle liu, que la cataratte est entre les deux tuniques 7000977. alçanoir entre la cornée & l'uvée, auquel

lieu il dit, qu'il y avn lieu vuide. Selon Halyabbas & Azaranius: humiditat großa, qua in oculo, casqulatur, inter Foranen vuez és cryftallulem generatur: c'est a dire que la crasse humidité qui est congelee dans l'œst, s'engendre entre la

c'est a dire que la crasse humidité qui est congelec dans l'œil, s'engendre entre la tunique vase, & l'humeur erystalline. Paul Agintat dit, que la sustitusion est Paul,liu, vne concrettion d'une humeur inutile; en

Paul, liu, de contrettore en l'endroit de la pru-6.chap, 11 la membranc cornée, a l'endroit de la prunelle, & ailleurs il dit, que c'est vn det-4 coulement d'humeurs, qui se concréent Paul, liu, entre la tunique cornée & l'humeur cry-

3. chap. stalline.

fait ex Gallien au 4. liu. de l'vsage des parties, foutient que la Cataraëte est au dessous des tuniques, entre l'humeur Albuginée, & cryfialline: & ceux qui adherent a lon opinion

de plusteurs Operations en Chirurgie. 123 fent que la castarates, loit comme vne coile d'araignée, qui s'engendre entre ces deux Galico de humeurs. Et dans vn autre endroit le mcl. 1º0/age me autheur dir, que la Castarates (e con-das parcrée, entre la tunique comée & crystàllame, siss tabapa.

Hier: Fabrice d'Aquapendence tres fa-1.004. meux Medecin & Chirurgien en patle ainfi, quant à moy qui ay fait deux ou trois fois cette Operation de ma main , & l'ay veii feconde faire à plusieurs autres , voyant l'aiguille fes Obepiquée dans l'œil derriere la tunique vuée rations & paroiftre toutesfois deuant la Cataratte, chirurgicela m'oblige a croire, que l'humeur se ques concrée autour de la tunique vuée, c'est a chap. 16. dire autour de sa circonference, ou vn peu derriere ce meime trou, en l'humeur aqueuse, mais puis que le trou, de l'uvée se dilate, il est plus probable que l'humeur congelée se tient justement derriere le trou de l'uvée, parce que si elle se concreoir en la circonference elle ne se dilateroit pas: ce sont la à peu pres les dineries opinions que nos Autheurs ont touchant le vray lieu de la Cataralle : ceux qui tachent de re-Soudre ces diuerses opinions estiment que la Cataracte est un nom general pour toute maladie opilatine des yeux : Or cette opilation, est tantost derriere I humeur cryftalline, d'ou procede la gutta serena, c'est a

dire goutte froide, & tantoff cette opilation

124 Traité Nouneau est deuant qui est le vray lieu de la catara-

du lieu
ou s'engëdrelamatiere qui
fait la catarasse,

d'accord.

the, la place de la mariere qui l'engendre, c'elt toute l'espace qui est depuis la tunique comité jusques au opsibillon, de sorre que l'eau se peut congeler entre les deux tuniques, à (ganoits : Voute & la copriés, ou entre l'vuée & le esphallin, ou bien entre entre l'expfallin ; & l'Albuginté & quelquessois elle peut remplit cou l'espace, le lon que la mariere est abondante, & voila commente les túdicies opinions demeurem

# Des signes de la Cataracte.

# CHAP. III.

plusieurs signespour connoistre la cataracte.

L ne fera pas difficile de vous donner prefentement des fignes pour connoifte la cataracile, fi nous auons feulement efgard, à la definition que jen ay donnée, & au diueries opinions que je viens d'alleguer, écle pourquoy je ne tiendray pas long temps le lecteur fur ce fijet, le diray feulement que les fignes pour connoitre la cataratie font que l'on voir vue cache dans la prunelle ou derrierre la prunelle de l'ail-laquelle tache eff quelques fois hanche quelques fois noire, on de colent celette, ou centrée la cataracie font que l'acceptant de la cataracie font que l'appendit que fois noire, on de colent celette, ou centrée de l'acceptant de l'acceptant de la cataracie font de l'acceptant de la cataracie de l'acceptant de l'acceptant de la cataracie de l'acceptant de l'accept

de plujieurs Operations en Chirurgie. 125 cendrée, ou autre lélon l'humeur qui y elt, quelquesfois, la veue en tour à fair empeloncée ce qui artiue lors que l'humeur elt matade, forf groffe, & cépaiffe, & quelquesfois les ne paroifient d'autres coleurs qu'elle ne font, d'emplement en la comparcial de la prunelle , & les choies qu'on frient par paroifient d'autres coleurs qu'elle ne font, d'emplement en la comparcial de la prunelle , & les choies qu'on frient qu'elle preferne aux malades luc femblent efte lus preperente aux malades luc femblent efte lus preperentes qu'elle preperente que su bien voir.

# Des Causes de la Cataracte.

CHAP. IV.

le ensemble.

Les caufes de la cataratée font deux, à deuxeux, feauoit, internes of externes.

Les caufes internes font des groffes vafeaures qui s'efleuent de l'effomach au certaeau tèc de la déclandent au yeux, d'où vient que 
lors que l'humeur est encor fubril, ou qu'il des eaufes 
ne peur pas encore estre apperceux, il femfiatures 
ble qu'on ne voit autre chosé deuant fes dus eausyeux, que de la fumée; & des vapeurs , ces 
rasteux 
yeux, que de la fumée; & des vapeurs , ces 
rasteux 
yeux, sue de la fumée; & dem 
roudent en humeurs visqueutes, 
puis elles se condençent, & congelent par la 
froideut des membranes , tout de messime 
comme nous voyons que la glacese compe-

descanfe Les caules externes font, comme ver desternes trop grande challeur, ou froideur a la teffe de la cace qui pourroit auoir canté quelque douleur & fluxion aux yeux; on connoilé que leur & fluxion aux yeux; on connoilé que

la cataracte provient des humeurs on valer figure peurs de Leftomach. Jors que le patient pour con cinc de la doule "a l'effomach. & que noilfre la cata vn jour que l'attre, & s'il a elté long la cata vn jour que l'attre, & s'il a elté long attavité temps fans auoir veu quelque chole de de l'effo-nebuleux dans fon ceil, c'ett figne que l'humach.

meur est verice de l'estomach.

On connoilt que les vapeurs viennent pour se grande douleur à la telte, on s'il y a encor uois lors mal, ou que s'magemation toit interestes, que la cause de cuttes facultés animales, alors c'elt acate figue que les humeurs s'ont descendies de vassevité la telte, & anni peut on juger des autres facultés autres son descendies de la te-

De la Curation des Cataractes.

#### CHAP. V.

Ac.

en ques Cette cute ne confife qu'en l'ordonempife detendant au malade de ne point boire du estiscure. Vin fort, n'y de ne manger des viandes qui

de plusieurs Operations en Chirurgie. 127 engendrent vn suc phlegmatique, & des groffes vapeurs ; il luy faut aussi deffendre toutes choses aigres, son pain doit estre pestri aucc du fenouil, parce que le fenouil quel regi-a la vertu de clarifier la veue, & empescher me de vique les vapeurs ne montent en haut; & vre il par sa vertu carminatiue il dissipe les va-sauc orpeurs dans l'estomach. Et parce moyen em. malade. peiche quelles ne peuuent monter au cerwest, & si vous voyez qu'il est necessaire surgation que le malade soit vn peu purgé & saignés sievées vous pourrez prendre l'advis d'yn Mede-vessiaires cin s'il se trouve, sinon vous ferez vous en la cumesme selon que vous le jugerez a propos, ration de il fera aussi necessaire de faire quelques fii-la cata-ctions & appliquer des ventouses au col, rade. & voilà de la maniere qu'il faut a peu pres traiter la cataracte lors quelle commence feulement à croiftre:

Les Anciens Autheurs nous ont laiffé appar clerit vne infinité des remedes , pour voyet appliquer deffus la partie & noramment par cellyres, mais l'œil ett vne partie tellement pinfear. Cellyres, mais l'œil ett vne partie tellement pinfear. delicate, & fi tendre, qu'il ne peut fouf-envointe frit n'y toutes ces poudres, ces liqueurs & i-feinie, ces onguents , joint que les malades ont beaucoup de repugnance pour fouffiir tous ces remedes, & s'ils font contraint de les fouifiir foubs l'efperance, d'en eftre foulagés ils ne s'y arrelben pos yn moment,

Traité Nouneau mais ils les coulent au moindre mounes. ment de l'œil, car il est impossible d'empescher que l'œil ne se meuue. Ce que considerant Hier: Fab.d' Aquapendente, il

Hier.Fab. a inuenté vn instrument propre pour appart. chap, 16. pliquer deffus les yeux toutes fortes de poudres & liqueurs, il appelle cet inftru-

ment phiole occulaire, comme vous le pouuez voir au femillet, 547. de la seconde partie de fes œuures , cet instrument est fait. en forme de ventoule, sa bouche est aussi large que l'orbite de l'œil, & a chaque costé il a vne petite anse, par où on la lie descripció dessus l'œil, en passant vne petite bande par de l'in- les anses, qui s'attache derriere la teste, afrument fin quelle demeure ferme dessus l'ail, Et

Fabricius droit au milieu de cet instrument, il y a vn

d'Aqua- petit tuyeau afin de donner issue aux vapendente. peurs de l'eau tiede dont on se sert pour rarefier l'œil, & pour y faire penetrer les medicaments. Car fi ces vapeurs n'auoyent point de sortie, elles pourroyet incommoder les parties d'alentour de l'œil , & attirer en dehors le globe de l'œil', ce tuyeau fert auffi pour verser dessus l'œil, les medicaments liquides, & par ce moyen les cataractes ont entierement esté dislipées principalement lors quelles font encor en leur commencement.

> Ie me suis par plusieurs fois, fort heureusement

de plusieurs Operations en Chirurgie. 129. reusement serui dans ce pays, auec le suiuant remede, je pren vn bon verre d'eau la manie! de fontaine, dans lequel je laisse infuser durant 14. heures vn peu de vitriol blanc, taraffe mais auant que de le mettre dans l'eau je felo l'anle pile bien menu, & lors qu'il est tout theur. fondu dans l'eau, je filtre cette eau par le papier de chassis, jusqu'à ce qu'elle soit bien claire, apres cela j'y adiouste vn peu d'eau rofe, & lors que ie m'en veux feruir je lailse romber deux ou trois gouttes de cette eau dans l'œil auec vne petite buche de paille : feruez-vous en au befoin & vous verrez la grande vertu de cette eau : on se ferr auffi de l'eau d'Euphraise de Chelidoine, & de Roses meslées auec vn peu d eau de vie , qui n'a esté distillée qu'vne fois , ayant vertu de dissoudre, de subtilizer, & de penetrer, qui sont les principales intentions, qu'il faut auoir en la curation de cette maladie,

Des signes pour connoistre la Cataracte curable, auec celle qui ne l'est pas.

### CHAP. VI.

qu'ell es qu'il fast gues , des caufes, & de la curation de uans que la cataratle, mais auant que de veuir à l'Ode vonir peration de la main, il faut (quoir mettre a l'éperal, tablés, & entrevelles qui ne le font pas mainelle raites, atablés, & entrevelles qui ne le font pas raites. cari l'y a des cataratles qui font futres,

& tellement enracinées qu'on n'en peut pas venir à l'honneur; comme vous pou-

les signes ucz voir par la suite de ce discours.

pour conmifre s Si la cataratte est de la couleur de l'air, la cata ou celestine grile ou cendrée, non pastrop ratte est blanche, laquelle estant frottée se dilate, bien meta. & d'abord se rassemble, & que le patient te.

ne peut discerner aucune chose, c'est vn signe tres-assuré que la cataracte est bien

gne tres-affuré que la cataracte est bie les signes meure.

Pour enmoifre la catarade catarade avec les doigts en fermant l'auqui eft tre ceil, & qu'elle s'elfargiffe tans fe raffemtrep ten-bler, & que le patient peut vn peu voir, & dress diferent les choses qui luy sont presentées de plusieurs Operations en Chirurgie. 131 c'est signe que la cataracte est trop tendre. 4.

P. Franco dit qu'il en a abbattu qui e-p. Franco floyent quafi auffi dure que corne de l'an-en fon terne, qui en les abbaiflant failoyent yntraist de bruit comme si on eust deschiré du papier. La cara-

Enfin il a catavatte elt noire & citrie, is, 100. & que la prunelle en foit trop remplie, de cli tigne quelle n'est pas propre à eltre las signes abattue, ni celle qui est faite par cause ex-d-se acterne, comme chette ou coup, parce que tranda est humeurs, & les esprits sont distipés.

Or il faut ici prendre garde s'il n'y a abattue, pas obstruction aux nerfs obtiques, car e terrir en vein de l'abarre s'este assertie en vein de l'abarre s'este affeire con

feroit en vain de l'abatre si cela estoit, car aussi bien lepatient ne verroit goutte.

Les signe

Les fignes pour connoiltre, s'il y a ob-pour ennfruction aux ners obtiques , font lors que neiffre le malade ne peur ifer voir, & eque lors fer agril qu'on ferme l'œil fain l'autre ne s'enfle y aostranpas, ou quand l'œil ett bien beau.

## De l'Operation manuelle de la Cataraëte.

#### CHAP. VII.

Plujeurs Ail funt que de faire cette Operation, plujeurs Ail funt demander au malade, s'il ne meulle il tent point de douleur de ctree, & prendre figure pri, garde s'il n'est pas tourmenté de toux & dre garde vomisseurent, & si le patient est tourmenté de faire l'Operation, jusques à ce que ces accidents l'operation, il faut aussi que le patient air l'operation, il faut aussi que le patient air l'esprit quie ; c'ett à dire qu'il soit pius

2 de toute passion.

quel dp. Ces choses estant bien considerés, il del Anésil saut choisir un tenips propre pour saire cetfur pour te Operation, assentia au décrossilant de 
abbattre la Lune & au printemps s'il est possible, 
les ente-pourreus que le Soleil ne soit au signe d'A-

ries, qui gouverne la tefte, ni en temps qualle f, de foudres & tonneures, puis le matinà l'une unition trois heures de Soleil 3, il faut faut don faire affeoir le patient fur vn banc effivoir, met au jambes decà, jambes delà s'il eft possible, pour faire, a chambre ne doit pas eftre trop claire, estis oper car la grande clarte rend les yeux du parains.

de plusteurs Operations en Chirurgie. 133
au Maittre, & il ne faut pas que le pacient ait le visage tout a fait tourné vers la
clarté, mais vn peu de costé, puis il faut
bandet l'esil fain, en y mettant vn peu de
coton dellus, pour empelcher son mouuement durant l'Operation.

Cela fair le Mailtre fe doit affeoit de uant le patient mais vn peu plus haut ; en de la me luy failaut mettre les mains lur les genomestals, puis il faur qu'un fetuiteur luy tiente par dertiere la trefte pour empelcher fair finit qu'il le tienne fermes alors cependant que cette Opéqu'il le tienne fermes alors cependant que cette Opéquel qu'el qu'n polita l'aiguille ; ce qui fe fait réalisme par va petit morceau de drap , le Maiftre mafchera cependaat des clous de giroffles ou du gingembre, se luy foulflura trois ou quarterois fon halcine dedans l'œil malades, pour l'efchauffere & preparer.

Cela ettant fait il faut dire au patient qu'il regarde fon nez, puis il faut mettre les doigts fui l'œil malade pour le tenir ferme, judques acc que vous ayez planté s'arigulle deflus la tunique conjemnus de allaramers le petit angle, affez pres de l'pri, Al. Pr. chap. bineafs dit qu'il faut planter le bour de wiissa. l'ariguille, aupres de la tunique comée, ou blanc de l'œil à la diffance d'un rayon vers le petit coin.

Traite Nouneau

Paul A gineta, chap. 21. \$\$14. 6.

Et Paul dit, en retirant les paupieres nous nous escarterons de l'Iris, l'espaisseur de la pointe d'vn stylet, ce qui est la mesme chose, car Albucasis appelle rayon ce que Paul appelle stylet, Celfe veut que ce soit au milieu, entre le noir de l'œil, & le coin plus proche de la remple, vis à vis du milieu de la cataracte / Paré dit qu'il faut planter

amb.Pa l'aiguille tout droit , jusques en la cauité vé liu. 17, de l'œil fans aucune crainte dedans la conshap. 22. jointine comme j'ay desia dit, entre le pewwwgie.

ou il par-tit cambus & la cornée droit au milicu des Be de plu- deux, en euitant les veines de la coniointue perations & alors il faut pousser laiguille jusques à ce qu'elle soit au milieu de la prunelle ou pupille, puis il faut tourner la pointe de l'aiguille vers la cataratte & pousser jusques à ce qu'elle ait quasi passé toute la prunelle, ce qu'on pourra voir à l'œil, car on verra l'aiguille par dessous la cataracte, alors il faut prendre la cataracte, par le milieu en la poussant vn peu dedans l'œil, afin de la pouvoir mieux prendre aucc l'aiguille mais il ne la faut pas trop pousser à cause des humeurs, puis il la faut mener en bas

de l'œil toute entiere s'il est possible. Estant ainsi abbaissée il la faut tenir su-Le tembe qu'il faut jette durant l'espace de quatre ou cinq mitenir IA nutes, puis il faut tirer l'aiguille en haut peu à peu en la tournant, non point tout à fait

de plusieurs Operations en Chirurgie. 135 hors de l'œil, parce que si la cataracte temontoit, à cause que l'on ne la tient pas plus sujette, il faudroit derechef repoulfer. l'aiguille pour l'abbattre vers le petit canthus, jusques à ce qu'elle y demeure, il faut aussi donner garde de ne pas trop élargir l'uvée, ou de bleffer l'humeur erstalline, à cause que c'est le principal instrument de la veile, & quoy qu'il temble que la Cataracte en l'abbaissant deuienne comme laict ou comme eautrouble, il ne fe faut pas décourager, car c'est vn signe qu'elle ne se peut reunir, & l'œil vient à s'esclaircir: s'il arriue qu'elle se rompe, il faut tacher d'abattre toutes ces pieces l'une apres l'au-tre, & s'il y demeure quelque piece qui ne puisse pas estre abattue parure la confumera-facilement.

Et s'il arriue qu'on ne la puille amener, en bas de l'ezil quelle peine qu'on y prenne alors il la faudra mener en haut, coimme dit Patrer France en fon Traité de la cataratte, o di dit l'auori fair plafeurs fois, se auce heureux ficces; caril dit, qu'elle s'y confume aufsi biett comme fi c'ettoi can bas de l'ezil, mais à cajité de la pelanteur il est a craindre dit. Il, qu'elle ne recourne plus aifement dans la prunelle.

La cataratte citant aiuli arrestée, il faut tout doucement retirer l'aiguille en haut 136 Traité Nouuean

de quelle manière il faut oster l'aiguille,

de peur qu'on n'ébranle de nouneau la le eananale, & l'attiret vers la prunelle : remarquez qu'en fortant l'aiguille il la fau É tournet tout de melme comme quand on la plantée, puis il faut rettre vo blanc d'out battu auce vn peu d'eau de rofes dellus l'eui, il ne fera pas mausais d'en mettre aussi dessius le front, & il faut laiffer le premiet appareil deux ou trois joüts dellus l'euit e, pourteu qu'il n'y sinuiendellus la pattie, pourteu qu'il n'y sinuien-

ne des douleurs, puis on le pourra remuer

deux fois le jour, & il faut aussi bien bandet l'œil sain que l'œil malade, car quand l'va

fe rennue, l'autre s'en fent.

10
yuel reji.

Quand à la diete, le patient se gardera
me drai- de manger des choses de mauuaise digeure ilsaus stions, comme j'ay dit ci dessins, on luy donme donc des bons potages au mouton,
aux matades,
du pain cuit auce vu peu de beutre frais,
son breunage doit estre de la tialante faite
auce de l'anis & du fenouil, & l'on tatchera
ausis de -luy tenir le ventre libre - neantmoins sans s'effecter, & s'il faut auois sons
me sans s'effecter, & s'il faut auois sons

Car

de plusieurs Operations en Chirurgie. 137 Car s'il s'estiorçoir pour regarder attentiuement la clarté; la eataratie remonteroir derechef; c'est pourquoy on mettra deuant l'esil yn morceau de tassetas verd, jusques à ce qu'il puisse bien supporter la clarté sans douleur.

Il arrine aufsi quelquesfois que la cataradle remonte bien tolt apres autor effé abartie, alors il flata attendre fept ou huit jours, puis tacher de la r'abbattte derechtef, pourneu que le patient ne fente point de douleur de teffe, mais il fatu paffer l'aiguille par le mesme trou, ou bien par vn autre, mais il eft plus de le passer par le mesme trou,

De la definition, difference, substance, & cause de l'ungula.

#### CHAPITRE VIII.

V Nguls' proprement parler, est une abjaine vereschiere qui fort hors du Laby-è de Vous, mat sur la comonitue, on them c'est une subject de la comonitue de la

Traité Nouveau des lieux C'est pourquoy Celfe dit que cette indis-

ou l'ong. position vient le plus souvent du costé du nairemet. nez, & quelquesfois du costé des temples, & lors qu'elle couure la prunelle elle luy

tes diff de donne empeschement.
L'ung. sent D'où nous pouvons recueillir, que l'ungula peut estre differente en quatre façons.

Premierement à raison de la quantité, la premie re differ fe car nous remarquons que l'vne est courte, prend felo & ne couure que la tunique consointine, & la gran- d'autres sont plus longues & vont jusques à Benduë de la tunique cornée.

l'ungula. Secondement elles sont differentes à raison de leur substance, car il y en a qui la seconde font dures, & d'autres qui sont molles.

La troisième difference se prend de la de la sub. couleur de l'ongula, car les vnes sont de couflance de leur citrine, les autres rouge, & d'autres full'ongula. ques selon l'humeur qui domine.

La quatriéme difference est, que l'on me diff. fe doit bien considerer l'adherance de l'unpred de la gula auec les autres parties de l'ail , puis couleur que nous remarquons que les vnes font

de l'ung. plus fixes & adherantes que les autres. La substance de l'ungula, sclon Alcoatin, comme rapporte Guidon, se peut dire char-

diff.fepred neufe & nerueule improprement, & fous de l'adhe divers respects.

rance que Car nous pounons dire qu'elle est charl'ungulà auce les neule, à caule que l'ungula est quelquesfois dure,

parties de 8 de la substance de l'ungula. L'aril.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 139 dure, extensible, & villeuse, ou fibreuse, comme les ligaments & membranes qui sue, sont parties nerucules.

En suite dequoy nous pouvons dire redet en qu'elle est charneuse, à cause de sa cou- gula se leur, & de sa substance esseuée qui se peut dir

rapporte à la chair.

Quoy qu'il femble que la caule de l'un-mus feut gula ne foit que primitine, comme vn d'uner se coup ou cheure &c. Cependant on r. F. fetti. « manque qu'elle arriue aufli quelquesfois par vne caule antecedente, comme lors de trong qu'il arriue quelque deflution aux yeux, four priceté pourquoy vn ancien Operateur à tres mittue de de group de la caule de l'orgula n'eltoit que la caule de l'orgula n'eltoit antecedente y comme des groffes humeurs vilquettes en gendrées de maunais regime ; qui s'amaleient au grand camhe de l'œil, à caule de la debilite des parties.

# De l'Operation Manuelle de l'ongula.

### CHAP. IX.

P Our bien faire cette Operation, il faut premièrement fituer le malade dessiss situation vn banc a la renuerse, c'est à dire qu'il faut du malaqu'il soit à demi couché, en telle sorte de.

qu'il ayt la teste panchée à la renuerse sur

le giron de l'Operateur,

Cependant il faut remarquet que fi l'angula eftoit en l'esti gauche, il faut que de lors l'Operateur, comme quand on vett abargul l'on- ret la cassvatle, mais fi l'angula et en l'esti solla eff droit il faut qu'il foit à la renuerle comme n'esti

gauche, je vien de dire.

3 Après cela il faut racher d'affermit l'oril
le mala- car fi le malade remiie l'oril ; il n'y à pas
de élant moyen d'abattre l'ongle , or il faut afferfaut af mit l'eril auce vn amneut de plomb, comme
fermit
dit Celfe, cet amneut doit auoir vn manche
Leil, vn peu lone: afin que le fertiteret qui tien-

maniere d'affermir l'œil felón Celfe.

vn peu long; afin que le seruiteur qui tiendra l'œil ferme auce ledit anneau n'empeche l'Operateur. Car vous m'advouerez que s'il faloit qu'vn serviteur tinst la paupiere d'enhaut auec la main, comme font plusieurs Operateurs, & vn autre seruiteur celle d'en bas, & l'Operateur qui aucc la main gauche tient le crochet auec lequel il sousseuc l'ungula & de la main droite l'aiguille,ce seroit cinq mains, or le moyen que l'Operateur estant entouré de tant de mains , puisse bien abattre l'vngula , c'est pourquoy on à inventé cet anneau de plomb, qui a vn manche qui fait que la main de celuy qui le tient n'empesche aucunement l'Operateur, joint qu'au lieu

de plusieurs Operations en Chirurgie. 141 qu'il falloit deux feruiteurs, il n'en faut qu'vn qui par le moyen de cet anneau, tient

les deux paupieres ouuertes. On peut aussi affermir l'œil sans se leruir ni de seruiteur ni d'anneau, en appli-niere quant dessus les paupieres, tant à la supe d'affermie ricure qu'à l'inferieure vn glutinatif com- l'ail par me je l'ay ven faire autresfois en Hollande le moyen laquelle methode je trouue beaucoup meil-tinaif. leure que non pas l'autre, voicy comment cela se fair? on estend vn bon glutinatif dessus vn petit morceau de linge auquel est attache vn ou deux petits bouts de ruban, & on applique ce glutinatif fur comm

la paupiere d'enhaut.

Et vn autre sur la paupiere d'embas, puis seruir on tire l'attache de la paupiere d'enhaut et glutipar desse le front jusques au col, & celle pour de la paupiere d'embas on la meine à costé sermir du menton jusques vers l'autre bout qui l'ail. est au col, où on les lie toutes deux ensemble, & par ainsi on n'a pas faute d'vn seruiteur, & l'Operateur n'estant pas embaraffé, ou ne voyant pas tant de maius au-

plus facilement. Ayant ainfi affermi l'œil & ouuert les la manie. paupieres il faut que l'Oparateur, esseue & re de leuer suspende i'ungula en haut par son milieu, l'ungula.

auec vn petit crochet ou deux felon

tour de sa teste fera l'Operation beaucoup

la necessité, & la tirer tout doucement ven

la maniela maniere d'ab. de fil vni entre la coniointine & l'ongula il battre y en a qui au lieu de se teruir de l'arguisle

y en a qui au fieu de le lertir de l'arguille l'ungula- le leruent d'une perite lancette, our d'un perit morceau de plume d'oye qui foit bien 9 taillé, les autres leparent l'ungula aucc un

la manis-poil de la quene d'vn cheual, c'est ainsi que re d'albattre pour, fe. carl si fouteniement Paus Ægiartra, c'at Four, fe. carl si fous levis s'appas auce vu petir bout lan Paus, de fil, & auce vu crin de cheual il la sígois & abbattois: Ensin de que lle maniere que celoir, il la faur tout doucement elleur & defenner, de la seniente, ou de la

& descharner de la conionitue, ou de la cornée,, ou du blanc de l'œil,

Muis il faut bien prendre garde que lors

is faur qu'elle est deschancé jusques au combo de bien pren. on ne coupe, ou n'ossense la combo de dre grade l'ail, on ne coupe, ou n'ossense la tunique ser les sue cornée, co la communite du cambo, qui est inquest la gardienne du trou, d'où coulem les landes yeux mes involonçaires, car si on ossense la chaire

mes involontaires, car si on offense la chair du laorymal, les larmes slueroyent tousiours par ce trou, qui est vnettes grande incommodité. C'est pourquoy il faut que l'Oped, rateur retranche du canthe de l'ans l'origula

lers que le si soigneusement qu'il n'y en reste pas la contre de moindre chose. l'ail est estimat. L'Operateur ayant abbattu l'angula doit

grande

masche.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 143 maicher vn peu de sel & du Cumin, & le mettre dans l'œil de peur que la paupiere qu'eftne se prenne ou s'agglutine auec l'œil, c'est l'Operate pourquoy il ne fera pas manuais de faire doit faire remuer de temps en temps l'œil au malade lors que & ne le laisser pas trop dormir jusqu'à ce l'ung. est abbattus que la cicatrice foit faite.

Mais au lieu d'appliquer dans l'œil du sel & du Cumin, on le pourra fort heuseule- la paument seruir de la Tuchie ou du Pompholix pierene se mis en poudre bien subtile , afin de desfei- prenne cher & deterger, & appliquer par dessus l'œil vne compresse trempée dans du blanc d'œuf,& vn peu d'eau de roles pour empe- pareil du. cher l'inflammation, & le remuer deux fois quel on fe le jour.

Et s'il arriuoit comme il arriue souuentesfois aux cataractes, qu'il y fut demeuré vn petit morceau de l'ungula, il la faudra consumer, car autrement elle pourroit renenir.

14 ce qu'il faut faire lors qu'il reste quelque pesite porison de l'uneula.

· feruir.

pecher que

la paupie re ne.s'aplutine auce l'ail

# De L'AEGILOPS.

De la definition, & cause de la fiftule lachrymale.

### CHAP. X.

de la fi-Aule In. chrymale

Gilops selon les Grecs, & selon les Latins fiftule lachrymale, eft defi-Inie, par Celfe, vne fittule qui naist au grand coin de l'œil, faisant souvent carie en l'os.

Ou bien nous pottuons dire ; que la siftule lachrymale eft vne rumeur contre nature qui est douloureuse, engendrée de sang & qui est située entre le grand canthe de

l'œil & la racine du nez.

selle con Nous remarquons dans l'Anatomie; paraifon qu'entre le pericarde & le cœur il y a vn de l'hu vuide que la nature y a laissé expressement midité qui est enafin de contenir vne humidité sereuse, pour tre lecœu rafraichir le cœur, & pour empecher qu'il ne s'enflamme, à cause de son mouvement ricarde. auec celle

continuel.

aui est co-Tense au grädeas the de l'æil.

Le mesme remarquons nous au grand coin de l'œil, car nous voyons que la nature y a fait vne glande que pluficurs appellent le grand cambe, afin de contenir & recenoir

de plusseurs Operations en Chirurgie. 45 receptoir vne certaine humidités, qui tombe, du certeau, afin de humecter & d'arrouser l'œil, de peur que par lon mouuement, continuel ne vienne à se desseicher.

Or il arrive quelquesfois que le cerueau enuoye vne si grande quantité d'humidité, cause de foit phlegmoneuse, soit catharreuse on pi- la ffeute tuiteule dessus cette glande, que par le long lachry-sejour qu'elle y fait cause que cette partie males tombe en aposteme, & à cause de son acrimonie, elle pourrit, ronge, & dilatepeua peu le conduit par ou elle fluë, de sorte que d'Aposteme elle degenere en vicere d'où vientqu'il en fort premierement des larmes meslees auec de la sanie, & par succession detemps il en sort de la sanie toutepure, & le lieu malade deuient dur & degenere en fiftule, que les Grecs appellent en leur langue, A: gilops & les Latins fiftule lachrymale parce quelle vient au lieu naturel, & au conduit des larmes.

Cette fiftule n'en demeure quelquefois fute lapas là, mais elle va blen fouuent juiques à chrymale l'os du nez, & rend quelques fois ven ma- orditiere fanieuse par les narines, laquelle sy nai rentidescharge par le trou, qui perce dans les fos da natines au grand coin de l'eril.

# De l'Operation Manuelle de cette filtule.

# CHAP. XI.

plusieurs TL faut situer le malade dessus vn siege, & lay bien faire tenir la teste, de peur qu'ilfant qu'en faisant l'Operation il ne la tourne touchant deçà n'y delà, & il luy fant bander l'œil La finatio fain afin que le fer chaud ne luy donne audu mala- cune apreĥension.

de.

Cela fait il faut auoir vne petite canule, les infru. foit d'argent. ou de fer n'importe, & la mets pour mettre droit dessus la fistule ou dedans, de cauteriser peur que l'œil ou les parties d'autour ne la finule ioyeur offentées par la chaleur du feu, puis il faut anoir vn cautere selon la grandeur male. de la fiftule & selon que vous le jugerez à

propos, car il y a des fistules qui tont plus grandes les vues que les autres : & mettre le cautere tout embrafé dans cette canule, re de can- & le pousser hardiment jusques a l'or


terifer la Carié. fitule la-

Amb. Paré se seruoit d'yne platine de chrymale fer , laquelle il appliquoit dessus l'ail & à l'endroit ou est la fistule, il y doit auoir vn trou, puis on prend vn cautere triangulaire, chap, 15. qui foit yn peu pointu aubout, le cautere

eftant

de plusteurs Operations en Chirurgie. E45 ethant embrate, il le aut introduite dans ce trou qui relipond direckement sur la spitule & ainti caureriset ladite spitule, qui est quaes il a messa concernice ladite spitule, qui est quaes il a messa conunir tout l'ouil, & pour le defendre qu'il ne sente point la chaleur du feu.

La cauterisation estant faite il faut mettre dans lo lunerture des tentes trempées des qui si dans du blanc d'eut battu aucc vi pou faus apd'eau de Rose, Plantin & Morelle, & ap-pliquer pliquer aux parties voitines, vine compresse sur les unes principa dans le messime, & lors qu'il comnite annemeçar à le feicher; il le fausta a'baber il renouuellet puisil faut tacher de faite tomber l'escarre, & proceder à la cure comme aux autres viceres cauterisses.



# QVATRIE'ME PARTIE

QV

Traité de l'Operation de l'Empieme, du Trepan & de l'Amputation d'un membre.

De la definition de l'Empieme de sa matiere, & de ses signes.

#### CHAPITRE L

gu'égl' aw Em grieme fels Eeft vne colection, & amas de pus dans Il E part. la capacité du Thorax ou bien nous poua. ch. 46. uous dire que c'ett vn amas de maitere Africian Purulente, qui est emfermée dans la capa-

Acfinition Purulente, qui est emfermée dans la capade PEm- Cité de la poirrine qui empeche que le Thopiens [6- ras, su puisse librement faire la fonction de less Lau- la respiration, telon qu'il seroir necessaire, abeur. Cepende plusieurs Operations en Chirurgie. 149
Cependant cette matiere qui est ensermée dans la poitrine est que que sois dif-940 l

mée dans la poittine est quelquessois dis-que la ferente, car nous remarquons qu'elle est ni cause quelquessois pituitense, quelquessois aqueu l'empireme se, se quelquessois elle est purulente, se il est dispartite austi quelquessois que ces trois sont rente

messes ensemble.

Il faut encor remarquer que la matiere la matier qui cause certe difficulté de respirer, ne re qui prouient pas tous une la poittine mel. eause lé, me , car la matiere printense est enuoyée enuoyée de la teste en la positine : l'aquente, vient de pludu soye & de tout le copps, mais la puna-fieur plene vient ordinairement de la positine mel. Parise me, à cause de quelque aboce qui pourroit du copp.

auoir esté en la membrane que les Anatomistes appellent pleure, ou bien à cause que d'une vraye pleuresie, ou d'une fausse écc. ) quinance le dis qu'il vient ordinaitement de la cause fue

Ie dis qu'il vient ordinairement de la rem qu'e poirtine à cause qu'il peur quelquesfois Empieme estre enuoyé du gosser en la poirtine, apres vue esquinance tournée en supportation.

Les signes de l'Empieme sont quatre.

Le premier est que le malade sent (lois égantajur qu'il lois debour ou couché) van grande sumajure pelanteur sur le diaphragme qui cause se extre difficulté de relpirer, & qui est ac-la difficunciament poi entre sur promatre, compagnée de tres-grandes douleurs poi-entre sur grantes.

les veri-

tables si-

Traitte Nonneau

Le second est, que si l'Empiéme n'est que fecond fi d'vn costé & que le malade soit couché gne pour fur l'autre , il entend & sent transcouler la conneilles matiere d'yn costé à l'autre.

Le troisième este qu'estant couché sur le eroisseme costé sain il semble au malade, qu'il a vn figno de pelant fardeau fur l'estomach, qui par sa pe-

l'épiems. fanteur prouoque & esmeut la toux,

Le quatriéme est? que le patient estant quatrieme figne couché sur le costé malade, il ne sent pas de l'em- tant de douleur, parce que la matiere qui pieme. est enfermée en la poictrine se repose sur

la matie- les costez, au contraire si le malade est coure se repo ché sur le costé sain, il faut de necessité que sant sur le la matiere se repose sur le Mediastin , ce qui cause de tres-grandes douleurs au malade , car le Mediastin a estéfait par la nature, afin de susprendre les visceres, & pour leurs au appuyer les vaisseaux.

malade.

12

diaftin.

Secondement il a esté fait pour separer la poitrine & le ponlmon, par le milieu de sorte que si vn costé de la poitrine est Cert le meoffense, le mediastin empesche, qu'il ne se peut pas si tost communiquer à l'autre, ni si facilement.

# Par qu'elles voyes se peut vuider la matiere qui est r'enfermée dans la poitrine.

# CHAP. IL

ON remarque que la matiere qui est deux vo-contentie dans la poirrine se peut yesparou éuacuer par deux voyes. la matic-

La premiere est? que si la nature est affez re fe peut forte pour enuoyer le pus aux brenchies éuacuer. du poulmon, il peut facilement estre jetté la premie par la bouche pourueu, que la malade ait re voye affez de force pour pounoir touffir, car par ou la sans cela il ne peut jamais sortir par matiera cette voye, c'est pourquoy il faut accou-fe peut rager le malade de s'efforcer a toussite tant c'est par qu'il pourra, la bouche La seconde est que la matiere se peut éua-

cuer par les veines, car nous remarquons en que la la poitrine au costé droit vne veine qui est matierese appellée azigos, cette veine le diuise en cinquer par branches qui s'espadent au costé droit, & au les veines costé gauche, pour nourrir les huit costes in-

ferieures, & les espaces qui sont entre icelles. descripcio de la vei-Or cette veine azigos à communication ne avigos. auec les veines Thorachiques, & après : munication que la veine azigos à auec les autres de la et-

veines de la poisrine.

Traite Nouneau qu'elle a fait sa dinission, elle se rend sons

le diaphragme, & du costé gauche elle se du foula-joint auec la veine emulgence, ou dans la gemët que veine Caue qui les avoisine, d'où vient que la faignée qui and on seigne ceux qui ont la pleureste, aporte à quand on seigne ceux qui ont la pleureste, coux qui au melme costé ou ils sentent leur mal, ils se ont la fentent d'abord grandement soulagez, c'est pleurefie. pourquoy Faloppe dit que le pus qui est dans

preune la poictrine se peut purger par les veines d'où vourmon il est enuoyé dans la vescie, car du costé tror que droit il descend plus bas & se joint auec les le pus qui veines , que nous appelons l'ombaires , & poirrine se uilse d'où vient que Faloppe dit qu'au comener par mencement d'une pleuresie il serois necessaire lesveines. de couper la veine du jarret, Mais il me

Curieux me pourroit Curieus icy objecter & demander comment peut objection. il estre possible que le pus ou la mairer

qui est enfermée en la poictrine se puisse éuacuer par les vrines sans le moster auec icelles.

response à Pour satisfaire à cette demande il faut rette obis-premierement scauoir, que tous les Medecins & Chirurgiens tant Anciens que Mo-Pauthori. dernes, tombent tous d'accord qu'il pent té de sous fortir de la verge, ou hors de la matrice du les Mede-fang, & du pus separement, & aussi meslés . cins, & enlemble.

Chirurg. que le fang ou le pus qui fort hors de la verge, ou hors de la matrice, vient on des-parties qui font deffes

de plusteurs Operations en Chirurgie. Or cela peut venir ou des parties qui le diasont dessous le diaphragme, ou de celles qui phragme

sont dessus le diaphragme. De celles qui sont dessous le diaphragme sont defcomme du foye, de la ratte, du mesentere, du sous le

pancreas, des intestins, de la vescie, des vre-diaphraseres, des reins, & de la mairice. De celles qui sont dessus le diaphragme, comme du poulmon, de la poictrine, du cour

ou du bras, ou de quelque autre partie, voire de tout le corps.

Or les signes pour connoistre de quel-les signes le partie la matière vient, sont ceux pour concy: c'est qu'il faut premierement deman-noifire de der au malade ou c'est qu'il sent de la dou-quelle leur, puis il faut bien considerer la couleur partie dit du pus, & sentir quelle odeur il a, il faut auffi pus vient deuëment considerer les accidents qui ont precedé, & ceux qui y sont encor. En luite de cela il faut considerer la quantité,

& la qualité du pus, & demander au malade ou aux affiltans s'il y a long temps que Hipp. Acette matiere se decharge parlà, car toutes phor. ce scholes & toutes ces considerations chap. vous indiqueront le lieu d'où peut venir ce de loc. af-

DHS. fett. Car par exeple Hippocrate dit que si queluaile odeur celamotre que la vefeie est vlce. de los

rée, & Galie, dit, que la bone faite aux parties

154 Traité Nouneau interieures, & loing des reins & de la vescie

peut estre énacuée par les vrincs.

Ce melme autheur cicrit que le pus de l'Appfleme du pontunon, eltant reccu par l'artere veneuse au veniricule gauche du cœur, de là en la grande artere, & de là en l'emulgene des reins peut passer par l'errure.

Gal, au D'auantage, il dit bien que la matiere, comman, qui est contenue en la poirtine, se vide par sur le le tentre, quoy que cette voye ne soit pas Apper dass enidente que les susdices. Car elle se fait r.liure. au trauers de toutes les autres patries , &

par les porolités du corps, veu que tout le corps cit ranipirable & outert, & renuoj 15 y cles excrements vers le ventre, comme lipp, aueu n'égour où cloaque propre à les recadems noits à quoy lemble bien s'accorder cette tadant & Cintence d'Hypperate lots qu'il dit que piene va jouvent la matiere va au ventre c'incontis annuel de me le pail de fem fondage la date vaniere prouvance. Et ant passe de le control de vector, en peur le madade es fem lieu estroit & reclus, en preuma, est ant passe de la lieu estroit & reclus, en

nie. un plus spacieux & ounert.

Pay fecité cy dellis vu Hilfoire, au trai-Hiltoire, de la pierre que j'ay tiré de Monf, fit le 16. Houllier qu'vne femme a pillé par l'épamentaire ce de quatre mois de la House qui quelde Laguessois effoir mellée auce du lang a caufe list, 4. de l'actimonie qui corrodoit quelque veine, elle fut traitée par des Medecins, comme

de plusieurs Operations en Chirurgie. 155 files reins cuffent eltés vicerés, parce que par internalle elle y fentoit de tres-grandes douleurs, cependant cette pauure femme mourut le quatrieme mois, elle fut ouuerte, mais on trouua les reins & la vefcie en deuxtier leur entier, & dans son cour deux pierres, & res tronplusieurs apostemes, lesquels se purgeoyent nées das le par les vrines , & en passant par les reins, cour d'ocausoyent cette grande douleur. Iepour- ne femme rois encor alleguer plusieurs autres Histoi- auec plusies remarquibles, pour prouuer comment post. le pus, qui est en lapoictrine se peut facilement éuacuer par les vrines, mais je crois que ce que j'en vien de dire suffira pour persuader le lecteur de cette verité, il reste feulement que nous monstrions comment c'est que le pus, ou le sang qui est jetré, par la verge ne le mesle pas aucc l'vrine pour prouuer cette verité, on n'a qu'à prendre deux phioles, & remplir l'vne d'eau, & l'autre de vin rouge ou du blanc mais le rouge est meilleur, & mettre l'orbire de la experienphiole ou est l'eau droit dessus celuy où est pronner le vin, & vous verrez à l'œil que le vin, que le pus montera en haut , au trauers de l'eau , & fe peut él'eau descendra en bas dans la phiole ou uneuer estoit le vin, sans se communiquer l'vn à par les l'autre, or le vin monte en haut, à cause sans se qu'il à plus d'esprits, & l'eau descend messer aen bas à caule de la pefanteur, de forte que me icelles in nous voyons ces choites de nos proptes yeux faites par des choites de nos proptes yeux faites par des choites inanimées, à plus forte raison il faut croite que la nature peut faite faisse le pau par les voines, & de la chte jetté par l'vrine.

La leconde preune que le pus se peut In feconde énacuer par les veines , sans se mester aucc le sang, se peut tirer des femmes qui sont que le pus nouvellement accouchées, auquelles on remarque quelquesfois que le laict tout par les pur qui est contenu aux mammelles leur veines fort par la matrice, or il faut pourtant que fans fe mester ace laict passe au trauers des veines que nous uec le appellons Mammillaires, & cependant on Sang. voit clairement que le laict ni le sang ne

font point mellez entemble.

Pareillement la vofise du fiel, attire à foy la coltre, d'aucc le lang, & la ratte la melanchelie, les rognons attirent la ferofisé du fang & la metent à par , laquelle puis apres ett jettée par l'urine, & cependant fi nous regardons du fang, on ne diroit pas que telle chofe y fur dedans.

## · De l'Operation Manuelle de l'Empieme.

### CHAP. III.

Out descrire auce ordre, la Methode plusieurs de bien faire cette Operation, il le choles faut premierement resouuenir de ce que qu'il faux nous auons dit cy-dessus, ascauoir que le considerer mediastin separe la poietrine & le poulmon en cesse droit par le milieu, afin que si le cotté Operation droit est offensé le mal ne se puisse d'abord communiquer au costé gauche, & si c'est au costé gauche qu'il ne le communique au costé droit.

C'est pourquoy je ne m'arresteray pas en quelle icy à descrire de quel costé il saut faire partie de l'incission veu que la mariere qui est dans la poidri. la poictrine, est ordinairement au costé ne la madroit ou au costé gauche, & quelquesfois tiere est aux deux costez, de sorte qu'on se voit quelques sois (s'il le faut ainsi dire) contraint de faire vne incision de chaque costé, afin de donner issuë à cette matiere.

De sorte que soit qu'on doitre faire l'in- ses qu'il cision au costé droit ou au costé gauche, sant il faut toufiours prendre garde à ces deux en failens chafes. l'incisson.

an failant en failant l'incifion, de ne bleller les parties l'incifion, de ne bleller les parties il fait internes de la poiètrine comme le pressarde prendre le poulmon & le duaphragme, &c. garde de Secondement il faut prendre garde s'il

garde de Secondement il faut prendre garde s'il ne bleffer elt possibile de ne pas offenser quelque parle pericar it extreme considerable qui pourroit rendestroul.

men of le die cette Operation fascheuse, comme diaphrag les veines, les arteres, nerfs or musme.

il f faut Or pout éuiter ces parties, on a remardamer qué qu'il elloit necessaire poutteu que la garde de difficulté de respire le puisse permetre que n'essente loit plutoit en l'expiration qu'en l'inpiter veines loit plutoit en l'expiration qu'en l'inpiniers, cation : Car on fait ordinairement l'incimesse.

moins ceux qui operent auec Methode, de fination forte que le malade estant ainli situé, de mals-le disphragme ne peut pas monter jusques de puelle de la fixiéme coste, à cause qu'il est retenu la licueix par les autres parties qui sont dessous luy,

il faut pareillement le poulmon n'estant pas rempli faire l'in-d'air ne peut pas descendre plus bas que cisson vers la quartieme & la cinquieme coste, & pour preuue on n'a qu'à prendre vn chien, & luy planter vne lancette ou bistory au

& luy planter vne lancette ou biltory au confins de la cinquieme & de la fixieme cofte, & vous verrez à l'œil que ladite lancette ne touche ni le diaphragme, ni le de plusieurs Operations en Chirurgie. 159 poulmon, mais elle se trouuera droit au milieu.

Orvoicy comment il faut faite cette de qualla incifion, il faut premicrement marquet maniter auce de l'eneré l'endroit où on veut faite faire l'incifion, or l'endroit le plus propre et étifiem. comme nous auons desia dit, entre la cinquiéme & la fixiéme coste, elen le tesmoignage de Leonde, d'Hippocrate de Gallen, &

de tous les Anciens & Modernes, Il faut commencer à faire l'incision aucomment commencement du bord inferieur de la il faut cinquiéme coste, & aller tout doucement faire l'in-jusques au bord superieur de la sixiéme, car nous remarquons en l'Anatomie que deffons le bord inferieur de la cinquiéme coste passe la veine , l'artere , & le nerf, de sorte qu'en faifant l'incifion, entre la cinquieme & la fixiéme coste on n'éuite pas seulement ces parties, mais aussi tous leurs rameaux. Ce qui n'arriueroit pas si on faisoit l'incisson ailleurs, qu'aupres de la sixiéme coste, car au bord inferieur de la cinquiéme se trenuent ces parties là, &cen l'espace intercostal se trouuent leurs rameaux. Ce font des considerations auquelles il faut bien prendre garde, car l'Operation del'Empieme ne se doit pas faire à la volée.

De sorte que vous remarquez bien

ces deux costes.

Il faut donc premierement incifer la peau, droit desfous la ligne que vous aurez faite auce de l'encre ainsi que l'enseigne Hyppocrate, parce que la peau à caule de sa dureté & espaisseur resiste au fer , & se perce auec difficulté, & ne nous permet pas à cause de sa resistance d'incifer exactement les muicles intercostaux, comme il feroit befoin

al faut faire l'in lon les fibres des muscles intercodaux.

ce.

On obserue aussi, en faisant l'incision, qu'elle aille telon les fibres des muscles incifion fe- tercoftaux, ou externes ou internes à canfe de la situation contraire qu'ils ont, c'est pourquoyil n'y a pas tant de danger d'incifer les muscles internes que les externes, parce que les muscles externes sont plus grands, & à caule qu'ils sont destinés par la nature à vn plus noble vsage, assauoir à l'inspiration, au contraire les internes sont moindres, & plus minfes & ne feruent qu'à l'expiration.

Et quoy que selon Hyppocrate les Ope-Ħ rations se doiuent faire tolt, afin de prom-Hypp. fent. 1. 2. ptement executer nos Operations princides l'offipalement quand elles font douloureuses, pour moins tourmenter le malade, & que la chole soit plustost expediée, car il dit, qu'il faut operer tost, pour expedier l'œuure, & de plusieurs Operations en Chirurgie. 161. promptement, afin qu'elle soit toustours en la main

Cependant on remarque qu'en cette O-Hipp. en peration il fait bon dy aller vn peu lente-la [ent. tament, a fin que l'incifion chant faite les sus adela poulmons se puissent affaitser plustost que methodo, d'estre offenses, se trounans dilates & remplisqui est vue chose a laquelle il faut bien prendregatde, pourveu que lors que l'onfait l'incisso, le malade loit en l'expiration d'all-leurs on doit raite l'incisso pluttost peut guerne l'estre l'incisso, le malade loit en l'expiration d'all-leurs on doit raite l'incisso pluttost petite Hire.

que grande, est-ce pour trois raisons.

La première est que l'incisson estant per ras. en tite, l'instammation n'y est pas tant à crain-chirurg.

chap. 462

dre.

En (Eccond lieu l'incision estant petite, les paties internes s'en portent bien mieux, car il ne se peuvent pas tant refroidir de l'air qui entre par vn petit trou, au contraire l'incision estant grasse di entresa beaucoup plus d'air en la posètrine, d'où vient que les paties nobles fousifrent beaucoup de dommage comme la raison le moustre falle.

L'incilion ethnt donc faire a proportion, il faut laisfer forrit la matrice qui et en la poichtine mais pas tourà la fois, se refouuenant tousfours de cette belle senence Hypper, d'Hyppocrate, que tous Empeiques, ou and. dis Hydropiques qu'on cauterize on incilee se apper, 37-

Traite Nonneau. route l'eau ou tout le pus fortent tout à coup ) meurent infailliblement.

Ceux qui sont suppurez, ou qui sont hydropi-

Or pour empescher que la matiere ne

Dornent estre incifez, ou bien cauterifez: Car li le pus & l'eau sont du corps espuisezs A la fois vont sounent au ombres Plutoniques.

forté toute à la fois le mesme Autheur au 2, des maladies commande de mettre dans l'incision vne tente canulée d'estain, & c'est la methode que les modernes observent encor aujourd'huy, car l'incision estant faite on doit d'abord mettre dans la playe vne tente canulée qui ait des ailes, ou bien il y fant attacher quelque bout de filet qui doit rester hors de la playe, de peur que le made la ca- lade en attirant son souffle n'attire en mefme temps la canule, qui par le moyen de laquelle ce filet est arrestée: cette canule doit auoir donnerif- plusieurs trous comme ces seringues des-

> Remarquez encor que cette canule doit estre vn peu recourbée afin qu'elle puisse passer obliquement en dedans, derriere la coste, en telle sorte que la recourbure soit tournée en bas vers le diaphragme, de peur

fue à la quelles on se sert aujourd'huy pour la ma-

il faut.

matrice, trice.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 165 que de son extremité elle ne rencontre le

poulmon.

Apres cela il faut mettre vne petite tente dans l'embouchure de la canule qui fort hors de la playe, & y mettre par dessus vn emplastre accompagné d'une legere com-presse, & lors que vous voudrez faire fortir la matière vous n'auez qu'à ofter cet- il faut te tente que vous auez mife dans le bout faire forde la canule , & laisser la canule dans la tir la mapoictrine, & vous verrez que la matiere tiere; en fortira facilement & en pourrez tirer felon que vous le jugerez à propos.

Cependant il arriue quelquesfois que la matiere est si épaisse qu'à peine peut elle paffer par la canule, comme il arriue quelquesfois à vn tonneau de vin ou la lie s'amaffe fouuentesfois deuant le trou de la boete ou quelque grain de raisin, de sorte que pour faire fortir le vin on n'a qu'à

souffler ou pousser auer vn petit baston dans la bocte, & d'abord il vient.

Mais cecy ne se pratique pas en la poi- au 5 dela Ctrine, car si la matiere le trouue trop é- meth. sh. paisse, & qu'elle ne puisse pas sortir par la 8. canule, alors Galien veut que le malade se couche sur la partie malade, & le faire tout doucement touffir & vn peu remuer ion corps. On pourra aussi selon le commandement de Galien fe feruir d'vne lege-

564 Traité Nouvesu re injection faire d'eau miellée, afin de rendre la matiere plus coulante & liquide, mais il faut remarquer que l'injection que vous ferez le matin, il l'a faut faire sortir le soir, & celle du soir le matin.

## De L'OPER ATION du TREPAN

Les considerations qu'il faut auoir aux playes de la teste lors qu'il y à fracture.

#### CHAP. IV.

l'Ay creu que pour bien enseigner la methode de treparer, il falloir donner vn exemple d'vne playe à la teste auec frature du Crane, a fin de monstrer au jeune Chitungien de quelle maniere on doit appliquer le trepan & pourquoy.

deuoir du Premierement donc supposez que vous

densirius Pretinent don Importes que na les éstimație eftes appellé aupres d'vn homme qui a vne for avait playe à la 16/16, la premiere chose qu'il faut pellé aupres d'abord faitre, c'est de bien interroger le pres d'om malade où les assistants, comment & auce malade, quel instrument il a receu ce coup.

Apres cela il faut raser auec vn rasoit tous les cheueux qui sont autour de la playé & faire vne insisson Cruciale, de la gran-

de plusieurs Operations en Chirurgie. 165 deur que vous le jugerez à propos, afin de pouuoir fonder & voir s'il n'y a qu'vne simple fracture, ou bien si elle est accompagnée d'enfonceure, & pour sçauoir si la fente de la fracture est petite ou estroite, grande ou spaciense.

D'où nous pouuons recueillir, qu'il y deux acarrine ordinairement deux accidents fort confiderer

confiderables.

aux fra-Le premier cit, que les humeurs entrent dures de en la fracture, & tombeut dessus la dure la teste. mere où elles viennent à se corrompre, & enflamment & infectent tout ce qui les enuironne, en luite dequoy on voit furuenir au malade fieure , resuerie, convulsion, & finalement la mort, à cause que les fra-Elures de la teste debilitent tellement l'os qu'il ne peut digerer comme il faut l'aliment que la nature luy enuoye, de forte qu'il s'y amasse vne grande quantité d'humidités excrementeuses à l'endroit de la fracture, qui insensiblement se glissent par la fracture fur la dure mere, & d'où elles ne peuuent estre repoussées, taut à cau'e de la foiblessede la partie, qu'à raison de la peritesse de la fente qui est en l'os, c'est pourquoy la pluspart de ceux qui meurent des playes de telte sont emportés par cet inconnenient.

Le second est, que quelquesfois l'os de

la teste s'enfonce, ou bien il tombe quel-

ques petits fragments de l'os en dedans fur la dure mere, lesquels piquent ladite membrane, & par consequent causent des douleurs tres aigües , des convulsions & quelquesfois aussi des apoplexies.

pourquoy il faut trepaner.

Toutes ces choses monstrent clairement au Chirurgien ce qu'il faut faire pour sauuer le malade, assauoir qu'il le faut trepaner pour les cinq raisons suiuances.

premiere raison pourquoy il faut Everaner.

La première est, afin d'enleuer les os,& ofterles esclats & fragments des os, lesquels n'estants oftés piqueroyent la dure mere & la pie mere, & quelques fois la propre substance du cerucau, & causeroyent de tresi dangereux accidents.

La seconde est, afin d'évacuer, déssecher

Coconde & déterger le sang, ou la sanie qui est waison pourquey il faus zrepaner.

tombée sur la dure mere par la rupture des vaisseaux, par ou elle est suspendue ou attachée au cernean, ou bien par ceux qui font parsemez entre les deux tables appellés diploé, or pour ofter ce sang il faut de necessité trepaner, car autrement il viendroit à se pourrir & à s'enflammer, & par ainfi caufcroit la mort au pauure malade.

troi Gem railon pourquoy il faat

La troisieme raison est, afin de donner issuë à la matiere qui se fait par la playe, laquelle n'estant offée pourriroit les memde plusseurs Operations in Chirurgie. 167 branes, & mesme le cerecau, ou bien elle comberoit par la fratture sur les membranes, où elle vient à s'enfammer & cause la mort.

La quatriémeraison el, afin de pounoir quarrié, appliquer les remedes necessaires & con merai on uenables dessus la fracture & à la playe pourque,

Enfin la cinquieme ration pour quoy on il fair trepane clipatre qu'autro plyesde la telte on tre paner, ne se peut pas commodement seruir sclon enquilque la necessité le demande des bandages me ratio que nous appellons en termes de Chitur-paraque gie repercussité se défensius qui sont des bà-il faut dages desquels on se fert and autres parties du corps , afin d'empescher l'inflammation , mais ces bandages ne peuven pas citre appliquées à la rette, à cauté de sa figure qui est rondes ce qui empesche qu'on ne la neut commodement let ni s'erre.

Ioint que les vaiffeaux qui foir au deffous du Crane, ne peuvent pas eltre ferrés pour exprimer & l'enuoyre le fang, ains feulement les extrcieurs, ce qui cauferoit de tres grandes douleurs & inflammations, à caufe que cette ligature par fa comprefii on empelchetoit le moutement des arteres y d'ailleurs elle arterletroit Pévacuation des exerciments fuligmeux, qui fe doiuent éuaporer par les futures du Crane, or eftil que fi le Crane eftoit trop

serrér ces vapeursne pourroyent pas sortir, joint encor que l'la tefte effoit ainsi serrée par ce bandage, le sang de la partie blesfée tomberoit de l'us les membranes & dessus le cerueau ce qui causcroit douleur, Chaleur, fieure, Aposteme, apopexie, spasme, paralyfie, & enfin la Mort, au lieu que par le moyen du trepan on empesche tous ces accidents.

Galien recite qu'vn Apotiquaire auoit son liu.de tellement bandé & lié la teste à quelcun re de ban

day,

la manie-ce qui cauloit vne si grande inflammation qu'il luy pensoit faire sortir les yeux hors de la teste, parce que cette ligature comprimoit & ferroit trop les fuures, de forte que les vapeurs fuligineuses qui s'exhalent ordinairement par les sutures , & par les porofitez du Crane, ne se pouuoyent aucunement exhaler par icelles, joint que par cette compression, les Arteres ne pouuoyent auoir leur mouuement pulsatif : De forte que la douleur & inflammation s'au-Hipp au gmenterent tellement que les yeux luy

creuerent & sortirent hors de la teste d'où playes de vient qu'Hyppoerate desfend de ne pas trop La tefte. couurir ni lier les playes de la teste, de peur

de causer douleur & inflammation.

### Comment il faut trepaner.

#### CHAP. V.

Aunt que nous enfeignions de quelle manirer il faut trepaner, il me lemble qu'il ne fera pas hors de propos de dire que le trepan ne se doit sppliquer sur la sil ne famine s'enfonçat sur le doit sppliquer sur la sil ne famine s'enfonçat sur les membranes, mais il appliquer sur peu à costé de la fente sur la sur paille, a fin que la circons sence du trepan, paille, a fin que la circons sence du trepan, paille deçà de delà, de lada, d'alture, & afin que la persoration se trovue pareille de tous costez. Mais remarquez cependant que si la playe a esté faite auec vn instru- Hier Fabinent tres-pointu comme seroit vn paingon ». Par Requiril s'et qu'il n'y cut aucune s'ente n'y frasture, à des per alors il sut a ppliquer le trepan droit dans s'at, an alors il sut appliquer le trepan droit dans s'at, an alors il sut appliquer le trepan droit dans s'at, an alors il sut appliquer le trepan droit dans s'at, an alors il sut appliquer le trepan droit dans s'at, an alors il sut appliquer le trepan droit dans s'at, an alors il sut appliquer le trepan droit dans s'at, an alors si sur la sur le sur le sur la sur la

On obserue aussi de ne le pas appliquer sur l'os de la fontenelle de petits enfans, parce qu'il n'est pas assez dur.

On remarque aussi de ne le point ap-Héper, pliquet aux remples ni en la region qui est aux plaau dessis, c'est à dire au muscle temporals rejectos, parce que le spassime y survient d'abord, & Care. 170 Traité Nouueau plusieurs autres accidents. Car

Si en la temple on fait d'un muscle section.

A la part opposée aduient convulsion.

Le trepan ne'se doit pas aussi appliquer sur l'os des sourcils de peur que par la pesanteur il ne l'enfonçe sur les membranes.

Il the faute Enfin on observe de ne le point appliquer par appliquer ten d'irelles, lefques étants offens qu'incre le respan sent de cres-dangereux accidents, joint que fine la fie trepan ne sy peut pas tenir si freme une a de un trepan ne sy peut pas tenir si ferme au ret de la reste, qu'aux autres parties de la reste.

Toutes ees choise estant bien consideres estant bien consideres il faut garier es labies de la playe aucc des plumaceaux faits de linges bien deliés, & prendre bien garde que le trepan n'offente le periorane, de peur de ne causer

s plusieurs facheux symptomes comme doudescriptio leur, instammation, sieure & autres sembladu perioduce de la periorane est vne production de la dure mere, qui sort en dehors par les

futures de la teste, de sorte qu'il est tres-certain qu'estant offensé son insignation par les tres-certain qu'estant offensé son insignation de la certain qu'estant offensé son la certain qu'estant de la certain de la cer

commun mité ne se communique facilement à la il fau dure mere, à cause de la continuité des parmalad, ties.

Apres cela il faur situer le malade, en luy

trepane. mettant dessous sa teste plusieurs draps

de plujeurs Operations en Chirurgie. 17½ pilés en doubles, & les bien prefer fur ton cheuct pour empelchet qu'en trepanant la tefte ne s'enfonce, & qu'elle ne vafaile de-gà n'y delà, c'est pourquoy i ne fera pas maunais de luy faire tenir la teste parvn feruiteur, afin qu'elle ne fe tourne que felon la volonté du Chirurgien, puis il luy faut boucher les oreilles auec du coton afin d'obtondre le bruit du Trepan.

Cela estant fait, il faut commence à comment percer l'os auce vn instrument qu'Hyppo- il faut erate appelle foret triangulaire, proche de commenla fente ou fracture, assu que le Trepau se cert purpuisse triangulaire puisse trepau se cert pur puisse triangulaire comme nous auons

dit cy-deffus.

Il y en a qui se seruent d'un instrument que nous appellons tariers, qui est tout semblable a celle de laquelle se seruent les echapentiers, mais on remarque que le forde que con par manière l'autre. Le trou chant fair il faut appliquer il faut le trepan en telle sorte que la pointe riran sermer le gulaire du Trepan entre droit dans ce trou trepan. Se tenir le repean auce la main gauche, se le tourner tout doucement auce la main deolte.

Il est necessaire durant qu'on tourne le trepan que quelcun l'arrouse vn peu aucc de l'huilerosat ou du laict, afin de le rendre

plus gliffant & mobile.

Ou bien loss qu'on rémarque qu'il y a faut de force pouffiere d'os dans le trou, on le temps en pourra forrir & le tremper dans de l'huile temps e rofat & le plonger de temps en temps for temps de l'enu de role, afiu de le refroidir bier de la value qu'il acquiert en ce tournoyement, dans de cau l'os effant brulé il en tomberoit plus l'en pour qu'il ne feroit neceffaire, & quand on aura cir.

"percé jusques en la partie moyenne du crane, qui est le diploé, ce qui se connoistra par le sing qui sortira du trou, alors il fautrefortirle repara & ostre la pointe ou l'aiguille triangulaire, de peut qu'elle n'ostrine les membranes & sonder auce vne espingle ou aiguille de quel costé l'os est leplus sicié, & Papuyer vne pu pus sur l'autre costé, asin que l'os soit de tous costés également percé tematquez aussi que lors qu'on a osté la pointe du trepar il ne le sur pas tant appointe du trepar il ne le sur pas tant ap-

no pointe du trepar il ne le faut pas tant apga'll au, puyer qu'anparanant de peut qu'il ne vienga'll jain ue à le plonger dedans par la pefanteur ce faire lors qu'on éuitera tant mieux estant bien inquas print thuit par l'Anatomie de l'espaileur que et, peut & doit auoit le Crane.

Finalement quand on verra que l'os fera quafi du tout percé (ce qu'on reconnoiltra en ce que ledit os branslera & en tournoyant le trepan ne trouuera plus guere de resistance en l'os) alors il faudra faire de plusieurs Operations en Chirurgie. 173
gjiller doucement vn petit dievatours entte ut
les labies de l'os incile pour l'ébranler le. 4mi, l'agereiment, & lors que l'os leta tout defiait des playes
il le faut empoigner & le titer dehors auce en parides petitespincettes desquelles vous voyez eulier,
vn affez grand nombre figure dans Amb.

Park.

Ayant offe Pos, il faut vn peu raclet & qu'il faux polir les bords de l'ouverture, auc vn petit faire les infirtument que nous appelous l'enticulaire qu'en à caute que vers fa pointe il ne reffemble «fit es pas mal à vne l'entille, car il est plat & reponde rond, pour empechr qu'il n'offine là dave mers, car les bord de l'os p'estants pas vn peu pollis, la chair qui recroistra en ce heu fera alpre, rude & inégale, & par ce moyen causeroit de tres grandes douleurs, & apres auoir poll l'os, il faut bien nettoyer toute

les scieures du Crane qui pourroyent estre tombées sur la dare mere en trepanant. Suite de ce Discours, ou la maniere de traiter les playes des testes apres les auoir trépanées.

#### CHAP. VI.

L reste maintenant auant que de finir ce dilcours que nous monstrions, qu'elle methode il faut garder pour guerir les playes des teftes qui ont efté trepanées.

Mais auant que de venir à l'application des remedes conuenables aux playes trepanées, il est necessaire d'auoir égard au

choses fuinantes. Il faut premierement sçauoir, que si on Amb. Paa trepané en temps d'hyuer il faut touvé liu- 10. siours tenir bon feu dans la chambre du des playes malade, mais il faut empecher la fumée an partitant qu'il est possible, afin de ne pas prochap. 14.

uoquer la sternutation & autres accidents, il faut aussi tenir les fenestres & les portes de la chambre ou est le malade bien fer-

mées, car le froid (comme dit Hyppocras.aph. 17. tes) est ennemy du cerueau, des os es de

Gal.au 8. tous les nerfs & generalement de toute nostre del'vjuge nature, à quoy s'accorde fort bien cette des part. belle sentence de Galien, lors qu'il dit,

chap. I.

culier.

de plusseurs Operations en Chirurgie. 175 qu'il te faut bien donner de garde, de ne réfroidir le cerneaus, quand on trepante & pluseurs apres auoit respané, car c'est le plus grand conjessament qui peut de advenir a malade qu'i à l'aguelles il telle compute, or si l'air ettoir plus chaud. J'aus priterle compute, or si l'air ettoir plus chaud. J'aus priterle compute, si l'est le fur pas refroidir suchaus que le cerneaus, si lue le fur pas refroidir suchaus car quoy que nous soyons en esté, & que respendanle cerneaus chant d'écourert l'en est refroidir fair.

& demande d'oftre cichauffé, c'est pourquoy quand on veu penfer le malade, il faurauoir vn bassin plein de braizes ou vne peste de for routembrasse, Jaquelle il faur faite tenir par vn feruiteur au dessus el at teste en telle sorte que le malade ne sente aucumementa chaleur, assin que par la reverberation d'icelle l'air qui est à l'entour soit corrigée.

Gependant il faut remarquer que si l'air educit excessionement chaud, comme aux, jours canirectaires & cupe le malade en fur incommodé, on pourra vn peu tafraichir la chambre auce de l'eau froide, ou de l'oscitcat, & entourer les fenestres de fenilles de vigne & chotes semblables.

On obserue aussi de ne pas trop expo pourquoy ser le malade à la clatré, que jusques à ce il ne saut que les accidents soyent passez, à cause que pas series la trop grande clarré resont & dissipe les saude aucsprits, & augmente plussurs fatcheux jours.

Traité Nouveau 176

accidents comme douleur, fieure, &c.

Voyons maintenant quelle methode il faut tenir pour guerir les playes trepanées, Il faut premierement faire, ou auoir roude quelle te preste vne petite tente faite de linges maniere il faut traiter les

playes

Comples.

bien deliés, ou bien de taffetas blanc ou rouge, & le tremper dans yn liniment d'huile rosat qui soit vn peu tiede, & l'appliquer trepantes. tout doucement fur la dure mere, mais remarquez que cette tente doit estre attachée à vi petit bout de filer qui doit demeurer pendu hors de la playe afin de la pouuoir tirer plus facilement de la dure mere car la dure mere n'est pas vue partie pour souffrit qu'on la touche beaucoup aucc despincettes desquelles on se sert ordinairement, puis il faut garnir tout l'os qui est découuert auec des plumaçeaux faits de charpis bien doux, & nele toucher auec aucune chose onctueufe.

> L'os estant ainsi garny, on doit mettre par desfus des tentes trempées dans vn digestif fait auec vn peu d'huile rosat & vu moyen ou jaune d'œuf mesté auce vn peu de therebenthine & appliquer encor par delfus toutes ces tentes vn emplastre de bethonica, & par deffus cet emplattre vne legere compresse accompagnée d'vn bandage quel'on juge le plus à propos.

Galien fait vn grand estat du sang de pigeon

de plusteurs Operations en Chirurgie. 1797 pigeon & de tourerelle, parce que ces animaux sont d'vn temperamment sec, & leur fang a vne grande cortespondance auec la dure mere, & luy tient lieu de suppuratif.

Il y en a qui y mettent vn peit de refine de fapin qu'on nomme olean abjegniens. aucc l'huile Rofat, parce qu'il n'eth pas matsuis qu'vn medicament fupuratif ioit vn Gal., na
peu emplattique, or l'huile Rofat tour feul liu, q, des
ne l'eth pas de forte qu'on trouue fort à fimples.
Propos dy meller vn peud ecette refine.

Mais au mclange de cette refine auce I huile rofat on obterue ordinairement trois chofes affanoir la diuterfiré des perfonnes qui font bleffes, le temps de la playe, & la failion de l'année, car aux pertis enfans & aux corps humides auxquels par confequent la dure mere est aussi fort humide, onne le fert que de l'huile Rosatrout seul.

Mais ceux qui font plus auancés en aamyfange
ge, & qui fone d'un temperamment chaud, de cute
& fee, il faut meller un peu de cette refine aaucc l'huile Rofat, parce que la dure mere uce l'huile
n'est pass fi roide, & parce qu'elle est plus le rofat.
feche.

On doit encor adjoufter plus de cette resne auec ledit huile Rosat, à ceux qui ont la teste grandement chaude & seche comme sont les personnes chauues, ou qui ont les cheueux crespés.

 Il faut encor remarquer, que lors qu'on craint l'inflammation, il faut qu'il y ait plus d'huile rosat que de resine par exemple on prend deux onces d'huile, con n'y adjoute que demy once de refine.

Hier Fa-

Au contraire fi on voit vne matiere purulente, louable & bien conditionnée, il faut adjoufter plus de refine que d'huile rosat, parce qu'il s'agit alors de deterger& dessecher la membrane, cependant il faut auffi bien prendre garde que fi le pus vient en assez grande quantité, on ne se doit aucunement seruir de cette refine, mais on se pourra seruir de l'huile Rosat tout seul ou biendu miel Rosar, & si on apprehende quelque inflammation autour de la partie blesse, on se pourra fort heureusement seruir d'une compresse trempée dans de Phuile Rosat.

Le temps se faut feruir des Suppurazifs.

On obserue aussi combien de temps ilse duquel it faut seruir des suppuratifs: On se sert ordinairement des suppuratifs, jusques à ce que le temps de l'inflammation foit paffe, & que tout soit parfaitement desseché, apres cela il faut venir à la generation de la chair, à couurir l'os, & à cicatriser la playe.

Il ne sera ausi pas maunais en cet endroit liure des de suiure le conseil d'Hyppocrate, assauoir playes de d'appliquer aux parties voilines quelque onguent refrigeratif, pour preparer la ma-

tiere

de plusieurs Operations en Chirurgie. 173 tiere qui découle lur la partie, & des défficatirs qui ayent la vertu d'abforber & condumer la maticre qui pourroit delia eftre fluée sur la partie, on se feruira anisi des additringents pour fortisser les parties adiacentes.

METHODE FACILE POVR couper vn Bras où vne Iambe.

Description du lieu où il faut faire l'Amputation.

#### CHAP. VII.

Entre les maladies dangereufes il ny en a point de si deplorable pour les pautires malades que le sphacete, d'autant qu'ils regardent auce frayeur l'entrée de la mort, lors qu'elle corrompt peu à peu l'action des patries, se les priue de la vie, sentiment se moutement, si bien qu'ils se voyent perdus se demy morts durant leur vie, auce l'aprehension de leur ruine totale, paul se cest vie maladie estroyable aux assistants phura par ses accidents. De sorte que si on n'y siu. 4. remedie promprement la partie malade. 45n; 193 enueloppant dans ses ruines les parties vossiless, represente aliement la face de la

mort & fait mourir la personne.

C'est pourquoy ann d'empetchez que la mortification n'aille plus auant, il fattdra retrancher lapartie maldace, car il vana nieux fiparet vn membre, que de laisfer perdre & mourir tout le reste du corps, car selon Hippocrate, Extremis morbis extrema debenur remedia: aux grandes & extremes maladies; il faut appliquer des remedes extremes andois vi feut que Cesse temedes extremes, d'où vient que Cesse des remedes extremes, d'où vient que Cesse des la maladies and des la maladies and la maladies.

temedes extremes, d'où vient que Celle diu.

5. ch. 16. lu., en ce cui il n'y a qu' vn vemede bien mifen5. ch. 16. lu, qui est de terrancher le membre qui se
meure peu à peu s, pour garentir le reste de
corps , quey que celle in se [s fisse pius sans un
extreme danger parce que souvent les malades mueme un l'Operation où de hemorias

gie ou de sincope.

celle.lin. Mais auant que de venir à l'Amputation, 7'eb.33. foit d'une jambe ou d'en bras, il faut (çauoir en quel lieu de la partie il la faut faire, car comme dit Paul Ægineta, ce n'est pas assez d'auoir le lieu propre & commo

paul, z.- de pour bien fituer & poter yn bydropigue jenea, li. mais il fant fit rout prendre garde de faire 6:6:6:0: la paracemof en la partie & à l'endroir qu'il faur, à l'equioir trois doigts au delfous & à cofté de l'bunbilie, au colfé gauche fi l'hydropife vient du foye, & au cofté droit fi elle vient de la ratte. Nous ne palerons pas icy que figuife ce mor de lien ni en de plufieurs Operations en Chirungie. 18x qu'elle façon les Anciens & les Philosophes modernes le prennent, nous tacherons feulement de monfiter, l'erreur où plufieurs Autheurs font rouchant le vray lieu ou il faur faire l'Amputation, & en fecond lieu nous donnerons des fignes, & des marques infailibles touchant le vray endroit, où l'Amputation fe doit faires, fondé non leulement fur plufieurs Autheurs, mais aufit authorife par la rai-

En cette Operation on a intention de il fatte trois choles. La premiere eft d'atre-confiderer être & d'empelênce que la corruption n'ail-3, chofes le plus auant, la feconde eft d'arrefter en cette le flux de lang, & la troisseme eft d'appai-operation.

fer la douleur.

C'eft pourquoy pluficurs Autheurs, ont crû que pour éuier ces trois accidents, il faloit faire l'Operation en la partie morte, & non en la partie viue, de lotte qu'ils outenfeigné de couperdans la chair morte entition l'épailéur d'vu bon pouce, & par ce moyen ils empeféhent l'hemorragie & la douleur, & pour empéleire, que la corruption ne gagne plus anant ils caturetizéné route extre chair morte qu'ils ont lailée, en telle forte que le patient leute toufiours la force du feu; car par ce moyen toute la partie morte s'en ya en

Traité Nouueau 182 escarre qui sert comme de couvercle aux vaisseaux & à la partie viuante, à cause de rean de cette cauterization qui est tellement cor-vigo en roborée par le feu que dans trois ou quatre fon liure jours pour le plus tard on voit que le des vice- mort se separe du vif : Et par ainsi ils arreres chapi-tent la mortification, le flux de sang, &

ne font pas tant de douleur, Pour monstrer que cette methode n'est prenue point du tout bonne, il faut que nous exa-que cette minions auec ordre les trois points dont-il s'agit en ceste Operation assauoir d'arrester bonne. la corruption, le fang, & la douleur.

l'advoile qu'en coupant dans la chair morte, le flux de fang n'y est pas tant à craindre comme si on coupoit dans la chair viue, mais on m'advouëra aussi que tous les Medecins & Chirurgiens commandent de laisser sortir quelques onces de sang apres l'Operation selon les forces du malade, car il est tres-certain que le sang qui touche cette partie pourrie a desia participé de cette corruption, de forte que si on ne laiffe fortir ce fang , il est fort à craindre qu'au bout de deux ou trois jours apres l'Operation , la gangrene ne se remette dans la partie, ou du moins ce sang causera quelques fascheux accidents, comme inflammation, phlegmon, ou de tresobiedion. grandes douleurs.

Mais on objecte icy qu'en coupant dans

de plusieurs Operations en Chirurgie. 18; la chair viue, le sang vient si impetueusement qu'on ne le peut pas arrester selon sa volonté.

A quoy je respond, que nous lions au destius du lieu ou la siça doit pasiter vu par quette fileu fort & destité, cel que ceux dont mayen ou les femmes se seruent a trester leurs cher emperée uneux, qu'on ferre tant qu'il se spondie se moyen les veines & les arteres sont s'angue en cellement servées que si le Chirurgion fait reprimpe dextrement l'Operation, il ne se perdar tautife, pas que trois ou quatre onces de lang, & mein, quoy qu'il en forte d'aunanage il ne saut pas croite qu'il vienne tout du corps, cat il en sort aussi de la partie qu'on a extirpée, laquelle regorge promptement ce quelle

Secondement ils laiffent vn bon pouce de la chair morte, parcé quelle est prinée du fentiment, de forte qu'il ne font pas souffir beaucoup de douleur au malade, & puis il cauterizent toute eetre chair morte &c,

auoit retenu de lang.

Ic vous prie de bien confiderer cette methode, & vous m'advouerez que pour confumer vue fi grande quantité de chair morte il se faut seruir de plusieurs cauteres embrasés, a sin que le malade sente la force & la chaleur du feu, car autrement il ne seruiroit de rien.

Or je vous laisse a penser si tous ces

cauteres par leur grande chaleur ne doiuent pas fondre la graisse & les autres humeurs, & s'ils ne doiuent pas brufler & eschauffer excessiuement les parties sensibles, comme les nerfs & tendons, & panicule, de sorte qu'au lieu d'empescher la douleur ils la causent cent fois plus.

Ioint encor que pour contumer vne telle quantité de chair morte, il faut de necessité qu'il se fasse vne croute ou escarre tres-dure & épaisse, laquelle empeschera que les exhalaifons des vapeurs malignes, & putredincules ne pourront trouner aucune fortie, de forte qu'elles montent aux parties nobles, car il est impossible que ces cauteres puissent si bien dessecher cette chair morte qu'il n'en reste quelque, peu, qui feruira comme vn leuain d'vne nounelle mortification.

Enfin quand toute cette chair morte fera consumée, Il ne peut de moins qu'il ni reste vne grande eminence de l'os. de forte que si on veut bien guerir la partie malade, il faudra encor scier ce bout d'os, car il est impossible que la chair viue y puisse croistre par deffus.

En vn mot s'il faloit couper dans la chair morte, je demanderois bien volontiers à ceux qui suivent cette methode, comment c'est qu'ils font, lors que la

de plusseurs Operations en Chirurgie. 185 gangene est au pied, allauoir s'lla attendent judques ac eq ue la mortification foit montée au haut de la jambe, qui est le vay lieu ou l'on doit faire l'Amputation lors que la mortification est au pied, ou bien s'ils coupent au pied dans -la chair morte.

le sçay bien que dans cette Operation on oblerue de couper si peu de la partie saine que faire se peut, mais je say bien aussi qu'on considere l'action de la partie, & la

beauté du corps.

Anh. Paré, recite qu'vn Capitaine nommé. Le Clere ethat niv na vailleau, receu vn coup de Canon qui luy emporta le pied vn peu au deifous de la cheuille, de laquelle playe il fut guess, mais comme il voyoir que la jambe luy empechoit, il la fit couper juiques a cinq doigts pres du genouïl, & fe fit faire vne jambe de bois-

De forte que fi la gangrene est au pied, Amb.Esqu'on leur coupe la jambe sau dessous du suspinos de genouil, afin de le pouvoir feruir d'une combinjambe de bois , 3¢ s'il falloit attendes (finos. 6° que la gangrene sur montée jusques là, fangrene, je vous laille à juger quelles douleurs les pauttes malades ne louffriroyen pas.

Concluons donc que lors qu'il s'agit de

te vray. lieu où il faut faire l'amputation,

couper vn bras ou vne jambe , il faut faire sy Pincifion dans la chair viue, & non dans life la chair morte comme plufieurs l'enfeifeignent , afin que l'alteration & la corruption ne se puisse renouveler.

# Comment il faut arrester le flux de sang apres l'Amputation d'un Membre.

#### CHAP: VIII.

A Pres auoir parlé du lieu ou l'Ampuration le doit faire il me femble qu'il ne fera pas hors de propos que nous monstrions comment & de quelle maniere il faut arrefter le flux de lang apres l'amputation, qui eft we chofe que le Chiturgien doit necessairement sçauoir.

Amb. Paré au commencement de son Apologie & au chapitre 36, de son douzieme liure, où il parle de quelle mare d'arre-Aer leftux de lano niere il se faut gouverner en la section des membres gangreneux, defend de ne se liu.12.ch. point seruir du cautere actuel apres l'am-36. de 812 putation, mais qu'il faut attirer les vaisfon apolofeaux auec des instruments que nous apgie. page pellons becs de Corbin, & les lier auec du filet double, & leur faire quatre points d'aiguille

de plusieurs Operations en Chirurgie. 187 d'aignille en croix, & y appliquer par defsus les adstringents, ce qu'il tache de prouuer par pluficurs Autheurs & Histoires remarquables, comme vous le pounez voir au lieu sus-allegué. Mais sans m'arrefter à ce que ces Autheurs en ont escrit, & fans vous alleguer les diuerfes Histoires qu'il recite pour prouuer que sa methode est tres bonne, je diray seulement que je ne l'approuue aucunement, fondé fur l'authorité de Galien au s. de la Galaus. methode & parl'experience qu'on en voit de sa tous les iours par des Maistres , tres-ha-meth. biles,& tres-expertsen ces fortes d'Operations, principalement à Paris dans l'Hostel Dieu & dans la Charité, ou on voit quali tous les jours faire des grandes & importantes Operations.

l'ay trouué dit Galien au lieu chédfüs allegué vn moyen fort fauorable duand nous voulons arrefter le flux de fang, caufé par le vice de la veine qui a efté rongée & mangée par quelque humeur pourit & corrompu: C'eft qu'il faut de necefsité vfer de médicaments cauffiques qui font écartes & crouftes, ou de ferrements acdents, mefme en tel cas quand on a du toutcoupé & retranchée equi effoit pourit, gafté & corrompu, le plus feur eft de bruiller la racine; r. Remraquez bien je vous pouller la racine; r. Remraquez bien je vous

188 Traité Nouneau.

la methode de Galten, & vous in'adde de Gal, voic rez quelle est assez capable de renverpeur ar. este to contrairesser le let rotues els copinions qui luy sont contraifice de les Car apres nous auoir mis deuant les jans. et les médicaments caustiques desquels

yeux les médicaments cauftiques delquels Grees, les Arabes & les Romains (efratroyentauant qu'il futartiné dans Rome,ou 
estant il exerça d'abord les plus belles & 
les plus importantes operations qui se 
fone sur le corps humain, & principalement 
en la séction des Membres gangereux, 
& ayant remarqué que la Methode des 
Romains estoit tres dangereute, il s'est 
addonné au courtees ardents afin de contimer la virulence & la putresaction qui demeure ordinairemence ne la partie : c'estoit 
là la methode de ce grand personnage lors 
qu'il s'agisloit d'autellet le lang apres auoir 
amputé vn membre.

Adjoustons a celle cy, la methode deiamenie Leonides que Paul Ageineta approude se l'arie per anno de doni lista de li grandes excladejang, mations dans ses écrits : (tres-bien dieil) les Paul Leonides auoit acconstumé de mettre le Clemi-fer ardent à la bouche des vaisseaux, car det. Certainemen il ny a rien de meilleury, car le fer airestle, ses fellement la fanc en le fer airestle, ses fellement la fanc en

le fer n'arreste pas seulement le sang en faisant vne crouste, Mais aussi il consume, esteint & fait mourir le reste de la malignité & pourriture, qui se peut glis-

de plusieurs Operations en Chirurgie. 189 fer, & courir aux autres parties, confiderez bien ces paroles, car il ne parle pas de la maniere d'arrester le sang des vaisfeaux qui ont esté incisés par vue solution de continuité, Mais il parle des membres gangreneux & corrompus, d'où vient que blasmant la methode que quelques vns tenoven, & principalement vn certain Zyro Ra-Eipagnol nonmé Zyro Racaldo, qui choit caldo que fort en vogue de son temps, (dit) mal donc essis en-& indiscrettement vn personnage de ce vogue temps à voulu blasmer la façon d'arrester l'an 1416. le flux de sang tant approuué des Anciens, qui apres auoir coupé vn membre mettoit le feu aux vaisseaux, & nous à voulu monstrer vne nouvelle maniere de les lier

artirer les jeunes Chiturgiens.

A quoy s'accorde fort bien (li je neure Guidon
Laquy s'accorde fort bien (li je neure Guidon
Laquy s'accorde de la laquy qui n'eftojt en fai.
pas apprentif en ces fortes d'Operations doit chi,
c'est chose plus seures, (dit-il) de cauterizet
la cel fer chand que non pas de s'amuser
au simples adstingents, car le feu contiume à l'instant la venenosité, se arreste
le sangpar la crouste qui se fait aux vasse-

seaux, lors que le cautere grille les extremitez des membres coupez. Ioint que

contre l'ancienneté & fans fonder fon opinion fur aucune experience & fans l'appuyer de vailons affez convainquantes pour

Traité Nouneau le feu fortifie les membres, & deseche les

humiditez corrompuës.

L'opinion d' Amb. Paré semble plus facile & defirable parle discours que non pas la nostre, & à la verité si elle estoit si aitée à pratiquer comme il l'affeure par ses escrits, je conseillerois aux Chirurgiens de suiure sa methode, mais il y a quatre raisons affez considerables qui me retirent de son, confeil & me contraignent à suiure le grand

pour môntrer quela ligature chemin des Praticiens. des vaif-

La premiere est, que les veines & les arteres le retirent apres l'amputation , de n'eft pas sorte que la ligature de ces vaisseaux ne se bonne. peut faire.

La seconde est, que le flux de sang empesche nostre veuë de les voir, pour faire la

ligature.

quatre

raifons

feaux

La troisième est, que pendant qu'on s'amuse à chercher les vaisseaux aucc les becs de Corbin , les forces du patient se dissi-

pent & se perdent.

La quatriéme est, que l'impression de la putrefaction qui demeure en la partie apres l'amputation , ne peut pas estre corrigée par les simples adstringents, lesquels au contraire peuuent renouueller la gangrene, en empeschant la transpiration, c'est pourquoy l'application du cautere actuel est plus louable & falutaire, apres l'am-

de plusieurs Operations en Chirurgie. 191 l'amputation des membres, auec le regime conuenable & autres remedes, que non de quelle pas la ligature des vaisseaux. Remarquez on soute encor que lors qu'il s'agit de coudre ou les vaillier les vaisseaux il faut passer auec vne fenux & grosse aiguille dans la chair qui se trouuc les neciautour des vaisseaux afin de la bien com-dents qui prendre, ce qui ne se peut faire sans cau-uent. fer de tres-dangereux accidents, car si celuy qui fait l'Operarion picque auec son aiguille vn nerf, ou feulement quelque partie nerueuse pendant qu'il veut estreindre & lier la veine : vous m'advouerez qu'il y suruiendra d'abord vne tres grande inflammation, l'inflammation fera d'abord fujuie de la convulsion, & de la convulfion la mort. De là vient que Galten, Galien. 34 n'osoit pas seulement recoudre les playes chap. transversales (ce qui toutesfois est moins pharma dangereux) que premierement il n'euft de. gen. connert les tendons des muscles, de sorte que s'il se trouue quelcun qui en soit rechappé, il me semble qu'il en doit rendre graces à Dieu, & non pas à vn remede si facheux & si douloureux, (mais à propos obiettion de douleur) on me pourroit icy objecter tirés hors que Galien au 5. de fa methode defend de de Gal.s. ne se point seruir des remedes douloureux, meth. parce qu'ils augmentent la fluxion, l'in-

flammation, & par consequent le flux

de sang: Or est-il que le cautere est vn remede fort douloureux, donc il ne s'en faut point seruir.

de quelle maniere il faut repondre à cette ebiestion.

A quoy il faut respondre que quand la necessité de la mort presse, on ne laisse pas de secourir les malades pour les accidents que les remedes peuvent causer, parce que la mort est bien plus importante, si bien qu'il vaut mieux causer des douleurs, fincopes & autres accidents, que non pas de laisser mourir le malade, & puis il nous est ordonné de préuoir aux inconuenients qui peuuent fuiure les operations par des remedes : car la douleur se peut empecher par la ligature qui se fait au dessus de la partie que l'on veut couper laquelle estourdit le sentiment, & puis par les remedes narcotiques, le fincope se peut appaiser par des remedes Cordiaques & ainsi des autres : donc il vaut mieux le seruir du Cautere que non pas de la cousture.

Ie pourrois alleguer encor plufeurs autres raiforis pour montrer la difference que les modernes d'aujourd'huy metrent, entre l'vfage des cauteres achuels auce celle de la coufture ou ligature des vaiffeaux: Mais comme je ne me tuis propolé en ce petit traitre que de donner yne methode briefye. & facile pour

alleu-

de plussum Operations en Chivargie. 195 autre, fans m'engager en aucune façon en la ditpute. Joint que je croy que les rations de les authoritez que je vien de produite sont allez fortes pour connaînere les plus opinialtres, au relle quoy qu'il en loit petsonne n'en pourra juger plus équitablement que ceux qui l'auront elfayé de l'ence de l'autremainere, se c'est à ceux l'à proprement que je m'adresse pour me seruir de fidelles resinoins neantmoins chacun doit faire le mieux qui luy est positible, afin de soulager les pautures malades.

> Comment il faut couper vn membre.

#### CHAP. 1x.

L'Amputation d'yn membre, est vne Operation si importante qu'il ne la faut pas liazarder temeratiement sansbon conseil, & auce l'asseurance de l'Operateur &; la disposition du patient: c'est pourquoy apres l'auoit exhorté à la patience, exproressé auns du danger de cusse amont l'aument si saudra venir à l'Amputation: car l'in. ... Somme dit Cesse, il se un basseur de cusse un me dit Cesse, il se peut bien faire que céna, tag.

la phacele requiere qu'on coupe le membre, mass que l'épla auquel fe roune le coppe famble à grand peine le pouvoir fupporter, toutes jois è il ne se presente auteun autre remade. S' que le pattent fait pour en mourir ; vu bon Medecin doit remonstrer qu'il n'y a point d'éperânce de guertion lans retrancher le membre, & cependant adveriir franchement du danger qu'apporte cette Operation, & puis couper le membre s'il elt requis, dequoy il ne haut faireaucune doute, car il vaut mieux essayen remede incertain que de n'en faire point du tout.

Le membre infest d'une playe incurable, Se dost couper, que le fain il n'acable.

qu'est ce.
qu'il faut
faire auant que
ds venir
àl'amputation.

Mais anant que de venir à l'Amputation il ne fera pas manuais de noutrit le partient quelque jours deuant que de venir à l'Operation auec des viandes seftauratives, et achte el uly augmente l'écourage use, de tachte de luy augmente l'écourage forces puillent fouthenir les accidents de cette Operation, de quelques heures de unant l'Operation on luy baillera vne potion cordiale, aucuns veulent qu'elle loit en meline temps vn peu nureurique, afin d'ailoupir le cerueau de le fentiment; de appliquent des remedes Huppfaltif, sa

de plusieurs Operations en Chirurgie. 195 dessitus de la partie mortifiée que l'on veut retrancher pour l'endormir, ex empescher par ce moyen la cruauté des douleurs que le fer cause par son action.

Apres cela il faut affeoir le malade del comment fus vn banc, afin que la jambe se puisse te li faut se uir bien serme, se l'approcher tout sur le malade à bour du banc, en telle lotte que le bour du banc vienne justement dessous le ge-

monil.

Puis le Chirugien attirera en haut tant Chimme, qu'il pourra auce les deux mains la peau gim. Et les mufeles, & fera vue forte ligature auce vue trefle forte & defliée, telle que celle dont les fermiense se feruent à trefler leurs cheuex, vu peu au destius du lieu où on pretend de faire l'Amputation , cette ligature feruira non feulement pour ferter les vaissant & pour empecher l'hemorragie; mais elle seruira ausli pour empecher la douleur : Car par la forte de cette ligature la partie deuiendra toute endormie & priuée des feuniemen pace que l'espirivital ne pourra pas reluire en cette par les netts.

Guidon veut qu'on face aussi vne ligatu-Guidon re en la partie morte, & commande de dost. 1. faire l'incision entre ces deux ligatures, afin trait. 6 d'empetcher qu'il ne sorte pas beaucoup de chag. 3. sanghors de la partie morte, car quand les

affiftants voyent vne si grande quantité de sang cela les épouuante, & le plus souuent ils blaiment l'Operateur,

Ces ligatures estant faites, il faut lier le genouïl dessus le banc, afin qu'il ne se puille bouger deçà ni delà, c'est pourquoy plusieurs mettent deux cheuilles dans le banc vne de chaque costé, & logent la jambe entre ces deux cheuilles.

Puis il faut auoir vne escabelle de la meime hauteur du banc, fur lequel il faut poser le bout de la jambe, & le bien atta-

cher à cette escabelle.

Apres cela il faut auoir trois hommes fort robustes & courageux, & mettre l'vn derriere les espaules du malade, afin de le bien tenir, Le second sera pour embrasser le banc & le genouïl & le tenir bien ferme: Et le troisiéme tiendra le pied & l'efcabelle, & par ainsi la partie sera tenue ferme.

. Puis celuy qui doit faire l'Operation, coupera auec vn bon rasoir, ou auec vn conteau courbé en rond, toute la chair jusquesà l'os, & la separera le mieux qu'il est

possible.

Remarquez en passant que s'il y auoit deux os à sçier comme dessous le genouïl y auoit deux os & dessus le carpe : il faudra separer la à Gier. chair qui pourroit estre entre ces deux

de plusieurs Operations en Chirurgie. 197 os, afin que la tçie ne trouue aucun empelchement, ce qui se pourra faire auec vn couteau qui soit vn peu courbe, & qui ait vne petite pointe.

Ayant coupé la chair, il faut viftement mariere fçier l'os le plus fubtilement & dextre il faut trement qu'il fora possible, & lailler coulet conper hors de la partie quelques onces de fang l'os.

felon la force du malade.

Apres cela , il faut cauterizer les vall- affaut feaux afin d'artecher le fang, il ne fera pas enqueigh manuais de cauterizer aufil. Pos afin que les efquilles s'enleuent plutoft, & apres best amauoir cauterizé la partie il faut deflier la Putte ligatire.

Puis il faut auoir l'apareil tout prest, comme vne bonne compresse faite d'ettoupes, laquelle il faudra premierement tremper dans de l'oxicrat; & puis y mettre par dessus le tuiuant onguent.

Be. Roli armoni Z viij.
Terre figill. Žiij.
Albu, ovorum. na. vij.
Olei, rofati. Žiij.
Aque plantag. Ži.

Incorporantur omnia funul, fiat linimentumi

Mettez de cet onguent par dessus vos compresses & les appliquez d'abord dessus 198 Traité Nomeau la partie , & autorou de la partie il faut mertre vn deffenfif, puis embander la partie auce vne bonne & longue bande qu'on aura premierement trempée dans de l'oxicrat.

Cela fair, il faut mettre par dessus cette bande vne vescie & l'embander encor.

situation dumalade dans son lict.

Toutes ces chofes estants faires, il faut mettre le malade dans ion liét, & ne remuer cet appareil que le sécond ou troité-me jours objen le quatriéme, apres cela on pourra leuer l'appareil & appliquer sur les vaisseaux des perits plumaçeaux trempés dans vn blane d'œuf, & la suiuante poudre.

38. Farin volatil. Ž vij.
Sang, Dracon. Iburis alvėi, an. Ž ß.
Bol. Armenters-figill, gipfi, ana. žij.
Ranarum aquat. preparat. mistjicė
enim aproprietate quadam occulta
fanguinem filiunt. Ž ij. pil. lepor.
minutifimė incil. fpongue noue. torminutifimė incil. fpongue noue. tor-

refacte ana ZB. fiat puluis subti-

lissim.

Et sur l'os il faut mettre des plumaçeaux tout secs, & par dessus toute la playe on pourra mettre le suiuant digestif.

4. Terrebenth. lota in aqua plantaginis.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 199 Olei rofati. 3 B.

Vstellum vaius oui Croci 9j. Mifce. Il ne faudra pas changer ce temede que le temps toute là digestion ne soit faite sur tout le faudra dessensis. Et appliquer tousours sur les changer vailleaux de cette poudre, jusqu'à ce que de remede l'hemorragie ne soit plus à craindre, apres cela il faut quiter le digestif, & tacher de mondifier l'ylcere auec le suinant mondifficarif.

Re. Terrebent lote in vino Z vj. Pulu: rad. arift. rotunde.

Iridis flor. farina bordet , ana Ziių. Mellis rofatt Zin.

excellent.

Aqua vita. Zi. Theriaces 311.

Misce fiat mundificatiuum.

Pendant qu'on procede ainsi il faut tal- comment cher de retirer en bas les muscles & la peau il fant qui auront esté éleues en haut, afin qu'ils conurir reconurent peu à peu les extremitez des l'os. os qui auront esté coupés, afin qu'apres que la cicatrice fera faite, les muscles & le cuit feruent comme d'vn cuffinet aux extremitez de ces os.

Plusieurs (pour tirer la peau & les muscles en bas) font d'abord que l'Operation erreur de est faite, quatre points d'aiguille en Croix quelques aux levres de la playe, mais il est impossi. Opera-ble de faire cela si dextrement qu'il ne se

Traité Nousean
perde vne grande quantié de lang, & plus
qu'îl ne feroit necessire, joint que les levres de la playe s'ensfamment, & se tumesent jusques à ce que la digestion soit faite, de sorte que les points d'aiguille s'erelachent & coupent la peau, tellement qu'ils
ne setuent de ctien.

Mais au lieu de le feruir de l'aiguille, comment pourra feruir de la coulture fechequi it faut fair et linge & l'emplafter auce le fuiuant onceaume guent & l'appliquer fur les bords de la feta.

y. Farin. volatil. Z j Mastic. thuris. sang dracon. Pulu.rosar. rub.gummi tragac.ana Zij. Misce cum albumine oui.

Ledit emplaftre s'estant bien seché & bien fort attaché aux bords de la playe, il faut pendre vue aiguille enfliée de bon silet double, & approcher cet emplastre ensemble, & par ce moyen les muscles & la peau s'approcheront plus que si on auoir passe l'aiguille en la peau & la chair.

Remarquez aussi, qu'en pensant la playe il faut aussi procurer la cheute des extremitez de l'os, que l'air &cla (çie auront alteré ce qui se fera en appliquant dessus les poudres catagmatiques: comme celle-cy.

B. Radicum, Aristoloc.rotund peucedanis Iridis storens Corticum pini ana. 3 s.

de plusieurs Operations en Chirurgie. 201 L'Euphorbe fait aussi tomber les esquilles de os carieux & l'emplaftre de Betho-

Remarquez encor qu'il ne faut pas tirer il ne faut les esquilles d'os lors qu'elles ne tombent les os pas d'elles mesmes par violence, mais il les violence. faut seulement vn peu esbranler, & laisser faire le reste à la nature, & aux medicaments dont nous auons donné la description, car ils ne tombent guere deuant le le trentième où quarantième jour, à compter du premier jour : & si la chair croit trop on la pourra confumer auec l'alun brulé, & proçurer la cicatrice, auec l'emplastre de diapalma, de Cerusa cocta, ung. desiccati. rubrum, deapompholigos, & semblables.

Et pour appaiser les douleurs, & les reà tractions qui arrivent ordinairement apres l'Operation, à cause que les nerfs se retirent vers leur origine, de sorte que l'esprit animal ne pouuant-passer plus outre donne en se retirant de certaines atteintes de douleurs convulsiues, a quoy ayant esgard Amb. Amb. Pa-Paré, nous a laissé par escrit vn onguent qui ré liu. 12. est de tres-grande ésficace contre le spaime chap. 36. paralysie, stupeur, contostion, distentions, & autres indilpolitions, principalement des nerfs, prouenantes de caule froide, en voicy la description.

Traité Nouveau. B. Salvia chamœpityos majorana.

202

Rorifmarini rute lauendule ana m. j. Florum chamom. melutot fummi anethi Et hyperici ana p. iy. Baccarum lauri & funiperi ana. Zy.

Rad. pyrethri. z y.

Mastiches asse odorate ana z j s.

Terebenthina, veneta, s.

Olei lumbricorum, anethi.

Et catellorum, ana. Zvj. Olei Terebenthina, Žuj.

Axungie, humane, 3 j. Croci. 3j.

Vini albi odoriferi. To j. Cere quantum sufficit. Il faut broyer ce qui doit estre broyé, & pulucriser ce qui doit estre pulucrizé, &

mettre le tout tremper vne nuit dans du vin, & puis apres le cuire auec les huiles sufdites & axonges en deux vases, & en faire artistement le linitif, & cula fin adjouttez-

y cau de vie Žiij.

#### 

## TABLE

# Du TRAITE' des HERNIES.

Nom & Ely.	motogie aes Etermes
	chapitre 1. page 1
De la Definition & d.	
all the same	" ch. 2.p. 3
Dalas G Ja II	

prognossique d'icelles. Ch. 3. p. 5.
Des signes des Hernies. Ch.4.p.7.
De la division des Hernies. Ch.5.p.10.

Description Anatomique de quelques parties qu'il faut necessairement sçauoir pour paruenir à la curation des Hernies. Chap. 6,p.12.

De la Curation de l'Hernie que les Grecs apappellent Bubonocéle, et les François Hernie intessinale, lors que le persoine n'est que distaté. Ch.7. p.15.

De l'Operation manuele du Bubonocele. ch.8.p.19.

Autre Operation du Bubonocele qui se fait auec le ser chaud. ch. 9.p. 21.

De la Curation de l'Hernie que les Grecs appellent Enterocele, & les François Hernie intestinale, lors que le perisoine est rompu

ch. 10, p.23.

#### TABLE.

De l'Operation manuele de l'Enterocele. ch. 11 p. 28.

Autre Operation de l'Enterocele appellée le point doré. ch.12.p.32.

Aurre maniere de faire le point doré. C. 13.P. 24 De la maniere d'extraire le testicule. C. 14. p.35 Autre maniere d'extraire le testicule.C.15.p.35 Des accidens qui arrivent à l'Enterocele.

ch, 16.p.40. De l'Operation manuele de cet accident.

ch. 17.p. 42. Antre accident qui arriue à l'Enterocele.

ch. 18.p. 43. De l'Operation manuele de cet accident.

ch.19.p.46. De la Curation de l'Hernie Omentale, que les Grecs appellent Epiplocele . ch. 20.p. 48. De l'Operation manuele de l'Hernie Omench. 21.p. 50.

De la Curation de l'Hernie aqueuse que les Grees appellent Hydrocele ch.22 p.51 De l'Operation manuele de l'Hernie aqueuse

ch 23.p.54. De la Curation de l'Hernie charneuse, que les Grecs appellent Sarcocele. ch.14.p.56. De l'Operatio manuele du Sarcocele C.25.p. 60 De la curation de l'Hernie venteuse, que les

Grees appellent Physocile ou Pneumatocele ch. 26.p.62. De la suration del Hernie variqueuse que les

Grecs

### TABLE

Greci appellent Circocele ch. 279,05; De l'Operation manucle de l'Hernie variqueufé, ch. 28,9,69. Autre Operation du Circocele ch. 29,9,69. De la furatio de l'Hernie humorales, 63,90,7,9 De l'Operation manuele de l'Hernie humo-

rale, Ch.31, p.72.
De la Curatio de l'Hernie umbilicale que les
Grecs appellent Exomphalon. Cl.32.p.73.

De l'Operation manuele de ces tumeurs. ch. 33.P.76.

# TA'BLE

De la II. Particaval est Traite des maux detrates

D Es causes, signes, co prognostiques de la suppression des vine. Ch.1.ph. De la sustation de la suppression de l'urine,

De l'Operation manuele de la suppression de l'orine, ch.3.p. 87. De la Cause des pierres, ch.4.p.91. Des signes des pierres, ch.5.p.92.

Des signes des pierres, Ch 5.p.93.
Diners remedes pour rompre, & pour faire
foreir la pierre, Ch. 6.p.95

De la maniere d'extraire les petites pierres du conduit de l'orine, ch.7.p.98.

#### TABLE.

De la maniere d'extraire la pierre aux petits enfans. ch.8.p.101. De la Maniere d'extraire la pierre aux hom-

mes par le haut & grand appareil, ch. 9.p.102.

Methode tres-affeurée pour extraire la pierre sans aucun danger , & sans faire souffrir beaucoup de douleur aux malades, ch.10.p.110.

Autre maniere d'extraire la Dierre sans faire aucune incision. ch. 11. p. 113. De la maniere d'extraire la pierre aux femmes. Ch. 12. p.115.

De la Curation des playes apres l'extraction des pierres, & de la sauation du malade ch:15.p.117.

> TABLE De la III. PARTIE

dans fon liet.

Traité de la CATARACTE.

V nom, & de la definition de la Cata-) racte, ch 1. p.1204 Du lieu ou la Cataracte s'engendre & s'arrefte, ch. 2.p.122. Des signes de la Cataracte ch.3. p.124. Des

TABLE

Des Caufes de la Cataratte ch.4.p.125, Dela Curation des Catarattes ch.5.p.126. Des signes pour Connositre la Cataratte curable, auec celle qui ne l'est pas ch. 6.p. 130. De l'Operation manuele de la Cataratte.

De la definition, difference, substance, & cause de l'Vngula. ch.8 p.137.

cause de l'Vngula. ch.8 p.137.
De l'Operation manuele de l'Vngula,

ch.9.p.139.

De la definition, & Cause de la sistule lachrymale,

Ch.10.D. 1446.

male, Ch.10.p. 144.

De l'Operation manuele de cette fissule
ch.11.p.146.

Description of the last of the

# TABLE

De la IV. PARTIE

0 1

Traité de l'Operation de l'Empiéme du Trepan & de l'Amputation d'yn Membre.

De la definition de l'Empiéme, de sa mattere, de les signes. Ch. 19148. Par qu'elles voyes se peut vuider la mattere qui est résermée dans la poitrine Ch. 29.151. De l'Operation manuele de l'Empiéme

ch. 3. p.157.

## De l'OPERATION du TREPAN

Methode facile pour couper on bras où one I ambe, description du lieu où il faut faire l'Amputation Comment il faut arrester le sux de sang apres l'Amputation d'on Membre, ch.8, p.186.

Comment il faut Couper vn Membre. chap. 9. pag. 1931











